Analyse avancée II – Corrigé de la série 3A

Echauffement.

On pose le changement de variable $x = \varphi(u) = u^2$, $\varphi'(u) = 2u$. Comme $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(2) = 4$, les bornes de u sont $\alpha = 0$ et $\beta = 2$. Ainsi

$$\int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+\sqrt{x}}} dx = \int_0^2 \frac{2u^2}{\sqrt{1+u}} du$$

Pour calculer l'intégrale en u , il faut encore un changement de variable. On pose $u = \psi(t) = t^2 - 1$, $\psi'(t) = 2t$. Comme $\psi(1) = 0 = \alpha$ et $\psi(\sqrt{3}) = 2 = \beta$, les bornes de t sont 1 et $\sqrt{3}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2u^2}{\sqrt{1+u}} du &= \int_1^{\sqrt{3}} 4(t^2 - 1)^2 dt = 4 \left[\frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + t \right]_1^{\sqrt{3}} \\ &= 4 \left(\frac{9\sqrt{3}}{5} - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} - \frac{1}{5} + \frac{2}{3} - 1 \right) = \frac{16\sqrt{3}}{5} - \frac{32}{15}. \end{aligned}$$

Exercice 1.

i) On résout d'abord le système donné en inversant la matrice :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} C_1'(x) \\ C_2'(x) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \tan(x) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\cos(x)^2 + \sin(x)^2} \begin{pmatrix} \cos(x) & -\sin(x) \\ \sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \tan(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(x) \tan(x) \\ \cos(x) \tan(x) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{-\sin(x)^2}{\cos(x)} \\ \sin(x) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc on obtient facilement que $C_2(x) = \int \sin(x) dx = -\cos(x)$ (rappelez-vous qu'on n'a pas besoin des constantes d'intégration pour une solution particulière).

Pour trouver $C_1(x)$ observons que

$$C_1'(x) = \frac{-\sin(x)^2}{\cos(x)} = \frac{\cos(x)^2 - 1}{\cos(x)} = \cos(x) - \frac{1}{\cos(x)}$$

et donc

$$C_1(x) = \sin(x) - \int \frac{1}{\cos(x)} dx.$$

Pour calculer cette dernière primitive, on pose le changement de variable $x = \varphi(t) = \arcsin(t)$, donc $\varphi'(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$. Par la formule du changement de variable (cf. Analyse I) on a

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \int \frac{1}{\cos(\varphi(t))} \varphi'(t) dt = \int \frac{1}{\sqrt{1-\sin(\varphi(t))^2}} \varphi'(t) dt \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int \frac{1}{1-t^2} dt = \int \frac{1}{(1+t)(1-t)} dt \\ &= \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt = \frac{1}{2} \left(\ln(|1+t|) - \ln(|1-t|) \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\left| \frac{1+t}{1-t} \right| \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{1-\sin(x)} \right| \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\left| \frac{(1+\sin(x))^2}{1-\sin(x)^2} \right| \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)} \right|^2 \right) = \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \end{aligned}$$

Ainsi $C_1(x) = \sin(x) - \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)} \right| \right)$ et donc

$$\begin{aligned} y_{\text{part}}(x) &= C_1(x) \cos(x) + C_2(x) \sin(x) \\ &= \left[\sin(x) - \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \right] \cos(x) - \cos(x) \sin(x) \\ &= -\cos(x) \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \end{aligned}$$

ii) Les points problématiques sont ceux où $\cos(x) = 0$ ou $1 + \sin(x) = 0$. La fonction f est donc bien définie sur tous les autres points, c.-à-d. sur $\mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + n\pi \text{ avec } n \in \mathbb{Z}\}$.

Pour $x_{2n} = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$, on a $\cos(x_{2n}) = 0$ et $1 + \sin(x_{2n}) = 2$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_{2n}} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(-\cos(x) \ln \left(\left| \frac{1+\sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(-\cos(x) \ln(|1+\sin(x)|) \right) + \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\cos(x) \ln(|\cos(x)|) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (-\cos(x)) \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln(|1+\sin(x)|) + \lim_{y \rightarrow 0} (y \ln(|y|)) \\ &= 0 \cdot \ln(2) + 0 = 0, \end{aligned}$$

où la dernière limite en y est calculée par Bernoulli-l'Hospital. En effet, les hypothèses sont satisfaites si on écrit $y \ln(|y|) = \frac{\ln(|y|)}{1/y}$ (le vérifier). A priori, on devrait séparer les cas $y > 0$ et $y < 0$ mais comme $\frac{d}{dy} \ln(|y|) = \frac{1}{y}$ pour $y > 0$ et pour $y < 0$, il suffit de calculer une seule limite :

$$\lim_{y \rightarrow 0} (y \ln(|y|)) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(|y|)}{\frac{1}{y}} \stackrel{\text{BH}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{y}}{-\frac{1}{y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} (-y) = 0.$$

Si on définit f en ces points par $f(x_{2n}) = 0$, elle est continue en ces points (on a en effet fait un prolongement par continuité).

Similairement, pour $x_{2n+1} = \frac{\pi}{2} + (2n + 1)\pi = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$, on a $\cos(x_{2n+1}) = 0$ et $1 + \sin(x_{2n+1}) = 0$. Ainsi

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_{2n+1}} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \left(-\cos(x) \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\sin(x) \ln \left(\left| \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} \right| \right) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\sin(x) \ln \left(\left| \frac{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))}{\sin(x)(1 + \cos(x))} \right| \right) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\sin(x) \ln \left(\left| \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} \right| \right) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\sin(x) \ln(|\sin(x)|) \right) + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin(x) \ln(|1 + \cos(x)|) \right) \\
&= \lim_{y \rightarrow 0} (-y \ln(|y|)) + \lim_{x \rightarrow 0} (\sin(x)) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \ln(|1 + \cos(x)|) \\
&= 0 + 0 \cdot \ln(2) = 0,
\end{aligned}$$

Si on définit f en ces points par $f(x_{2n+1}) = 0$ (prolongement par continuité), elle est aussi continue en ces points et donc sur tout $\mathbb{R}$.

iii) Les points qui pourraient poser problème pour la dérivabilité sont les points où f n'était pas continue à la base, c'est-à-dire $\{x_n = \frac{\pi}{2} + n\pi : n \in \mathbb{Z}\}$.

Étudions d'abord la dérivabilité de f en les points de la forme x_{2n} . Pour ces points on a

$$-\cos(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right) = \sin(x - x_{2n}),$$

et donc

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_{2n}} \frac{f(x) - f(x_{2n})}{x - x_{2n}} &= \lim_{x \rightarrow x_{2n}} \frac{-\cos(x)}{x - x_{2n}} \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow x_{2n}} \frac{\sin(x - x_{2n})}{x - x_{2n}} \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow x_{2n}} \frac{\sin(x - x_{2n})}{x - x_{2n}} \cdot \lim_{x \rightarrow x_{2n}} \left(\ln(|1 + \sin(x)|) - \ln(|\cos(x)|) \right) \\
&= 1 \cdot (\ln(2) + \infty) = \infty
\end{aligned}$$

parce que $\lim_{x \rightarrow x_{2n}} -\ln(|\cos(x)|) = \infty$. Ainsi f n'est pas dérivable en x_{2n} pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour les points de la forme x_{2n+1} on a

$$-\cos(x) = -\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(x - \left(-\frac{\pi}{2} - 2n\pi\right)\right) = -\sin(x - x_{2n+1}),$$

et donc

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_{2n+1}} \frac{f(x) - f(x_{2n+1})}{x - x_{2n+1}} &= \lim_{x \rightarrow x_{2n+1}} \frac{-\cos(x)}{x - x_{2n+1}} \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow x_{2n+1}} \frac{-\sin(x - x_{2n+1})}{x - x_{2n+1}} \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) \\
&= (-1) \cdot (-\infty) = \infty
\end{aligned}$$

parce que $\lim_{x \rightarrow x_{2n+1}} \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right) = -\infty$. Ainsi f n'est pas dérivable en x_{2n+1} pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La fonction f n'est donc pas dérivable en $x_n = \frac{\pi}{2} + n\pi$. Ceci est une conséquence du fait que f est solution de l'équation différentielle $y'' + y = \tan(x)$. En effet, si f était (deux fois) dérivable en ces points, on aurait une contradiction parce que le membre de droite $\tan(x)$ n'est pas défini en ces points.

iv) Le produit de deux fonctions périodiques est périodique si le rapport des périodes est rationnel et la composition d'une fonction quelconque avec une fonction périodique est périodique. Ainsi la fonction f est périodique en tant que produit des fonctions $-\cos(x)$ et $\ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right)$ qui sont les deux 2π -périodiques.

v) On a

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= -\cos(x + \pi) \ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} \right| \right) \\ &= \cos(x) \ln \left(\left| \frac{1 - \sin(x)}{-\cos(x)} \right| \right) = f(x), \end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned} \ln \left(\left| \frac{1 - \sin(x)}{-\cos(x)} \right| \right) &= \ln \left(\left| \frac{(1 - \sin(x))(1 + \sin(x))}{-\cos(x)(1 + \sin(x))} \right| \right) \\ &= \ln \left(\left| \frac{1 - \sin^2(x)}{-\cos(x)(1 + \sin(x))} \right| \right) = \ln \left(\left| \frac{\cos^2(x)}{-\cos(x)(1 + \sin(x))} \right| \right) \\ &= \ln \left(\left| \frac{\cos(x)}{1 + \sin(x)} \right| \right) = -\ln \left(\left| \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right| \right), \end{aligned}$$

et donc f est bien π -périodique.

Voici encore les graphes de f

et de f' :

Exercice 2.

- i) Pour résoudre cette équation linéaire du 4^e ordre à coefficients constants, on utilise la généralisation de la méthode vue pour les équations du 2^e ordre.

L'équation caractéristique de l'équation différentielle donnée est $\lambda^4 - \lambda^2 - 12 = 0$ et admet les racines

$$\lambda_{1,2} = \pm 2, \quad \lambda_{3,4} = \pm \sqrt{3}i.$$

Comme toutes ces racines sont des racines simples, la solution générale de l'équation homogène associée est

$$y_{\text{hom}}(x) = C_1 \cos(\sqrt{3}x) + C_2 \sin(\sqrt{3}x) + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x}.$$

Par la méthode des coefficients indéterminés, une solution particulière de l'équation complète est de la forme $y_{\text{part}} = Ax + B$, ce qui mène à l'équation $-12(Ax + B) = 12x + 5$, d'où on obtient $A = -1$ et $B = -\frac{5}{12}$. La solution générale est ainsi

$$y(x) = y_{\text{hom}}(x) + y_{\text{part}}(x) = C_1 \cos(\sqrt{3}x) + C_2 \sin(\sqrt{3}x) + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x} - x - \frac{5}{12},$$

$x, C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}.$

- ii) L'équation caractéristique est $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 3\lambda + 9 = 0$ et ses racines sont

$$\lambda_1 = 3 \quad \text{avec } p_1 = 2 \quad \text{et} \quad \lambda_2 = -1 \quad \text{avec } p_2 = 1.$$

La solution générale de l'équation homogène associée est alors

$$y_{\text{hom}}(x) = P_1(x)e^{3x} + C_2 e^{-x},$$

où $P_1(x) = C_0 + C_1 x$ est un polynôme de degré $p_1 - 1 = 1$ et les constantes $C_0, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Pour appliquer la méthode des coefficients indéterminés, on regarde si les membres de droite et leurs dérivées satisfont l'équation homogène. Clairement e^{-x} est une solution et $\sin(x)$ n'en est pas (regarder la solution générale y_{hom}). La fonction $x e^{-x}$ ne satisfait par contre pas l'équation homogène. Ainsi une solution particulière y_{part} est de la forme

$$y_{\text{part}} = Ax e^{-x} + B \sin(x) + C \cos(x).$$

et ses dérivées sont

$$\begin{aligned}y_{\text{part}}' &= Ae^{-x} - Axe^{-x} + B \cos(x) - C \sin(x) \\y_{\text{part}}'' &= -2Ae^{-x} + Axe^{-x} - B \sin(x) - C \cos(x) \\y_{\text{part}}''' &= 3Ae^{-x} - Axe^{-x} - B \cos(x) + C \sin(x)\end{aligned}$$

Si on met y_{part} dans l'équation différentielle donnée on obtient

$$16Ae^{-x} + 2B \cos(x) + 14C \cos(x) + 14B \sin(x) - 2C \sin(x) = e^{-x} + \sin(x),$$

d'où

$$16A = 1, \quad 2B + 14C = 0 \quad \text{et} \quad 14B - 2C = 1.$$

Les solutions sont $A = \frac{1}{16}$, $B = \frac{7}{100}$ et $C = -\frac{1}{100}$. Ainsi

$$y_{\text{part}} = \frac{1}{16}xe^{-x} + \frac{7}{100} \sin(x) - \frac{1}{100} \cos(x)$$

et la solution générale de l'équation donnée est

$$y(x) = y_{\text{hom}}(x) + y_{\text{part}}(x) = C_0e^{3x} + C_1xe^{3x} + C_2e^{-x} + \frac{1}{16}xe^{-x} + \frac{7}{100} \sin(x) - \frac{1}{100} \cos(x),$$

où $x, C_0, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Exercice 3.

i) L'isocline associée à la pente c de l'équation différentielle $y' = f(x, y)$ est donnée par $f(x, y) = c$.

Comme $y = 0$ n'est pas solution de l'équation $y^2 y' + x^2 = 0$, on a $f(x, y) = -\frac{x^2}{y^2}$ avec $y \neq 0$. Les isoclines associée à la pente c sont donc données par l'équation

$$c + \frac{x^2}{y^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad cy^2 + x^2 = 0.$$

Pour $c = 0$, cette équation décrit la droite $x = 0$. Quand $c \neq 0$, on a $y^2 = -\frac{x^2}{c}$ ce qui implique que $c < 0$. Les isoclines dans ce cas sont

$$y = \pm \frac{x}{\sqrt{-c}} \quad \text{avec} \quad c < 0,$$

donc aussi des droites (deux pour chaque pente c).

Les isoclines pour $y' \in \{0, -\frac{1}{10}, -\frac{1}{2}, -1, -2, -8\}$ et les trajectoires intégrales pour les conditions initiales données sont représentées à la Fig. 1.

ii) L'équation différentielle $y^2 y' + x^2 = 0$ est une équation différentielle à variables séparées

$$y^2 dy = -x^2 dx,$$

dont la solution générale est obtenue par intégration (ne pas confondre la pente c et la constante d'intégration C):

$$\frac{1}{3}y^3 = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{C}{3}, \quad C \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad y(x)^3 = C - x^3, \quad C \in \mathbb{R}$$

Fig. 1: Les points indiquent les conditions initiales données.

Comme $y(0)^3 = C$, les solutions pour les conditions initiales données correspondent au choix de $C = -1$, $C = 0$ et $C = 1$ et l'on obtient respectivement (voir la remarque en bas) les solutions maximales $y(x) = \sqrt[3]{-1-x^3}$ sur $]-\infty, -1[$ et $y(x) = -\sqrt[3]{1+x^3}$ sur $]-1, +\infty[$ (cas $C = -1$), $y(x) = -x$ sur $]-\infty, 0[$ et $y(x) = -x$ sur $]0, +\infty[$ (cas $C = 0$), $y(x) = \sqrt[3]{1-x^3}$ sur $]-\infty, 1[$ et $y(x) = -\sqrt[3]{-1+x^3}$ sur $]1, +\infty[$ (cas $C = 1$). On vérifie alors que ces fonctions correspondent aux trajectoires sur la Fig. 1 ($C = -1$: courbe inférieure; $C = 0$: droite $y = -x$; $C = 1$: courbe supérieure).

Remarque : réécrite sous la forme requise par le théorème d'existence et d'unicité l'équation devient :

$$y' = -\frac{x^2}{y^2} =: f(x, y)$$

Cette fonction f , ainsi que la fonction dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2\frac{x^2}{y^3}$ (voir la semaine 6 pour les détails), sont des fonctions rationnelles et donc continues en tout point de leur

domaine de définition

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0\}$$

(voir la semaine 5 pour les détails). On a donc une solution unique de l'équation différentielle passant par tout point de D . Les points de la forme $(x, 0)$ ne sont pas couverts par le théorème d'existence et d'unicité (au moins pas si on cherche une solution qui passe par ces points sous la forme d'une fonction $y(x)$). Ceci se manifeste dans les solutions par la divergence de $y'(x)$ en $x = -1$ (cas $C = -1$) et en $x = 1$ (cas $C = 1$). Le cas $C = 0$ est encore plus particulier. On pourrait admettre que la fonction $y(x) = -x$ soit une solution de l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$ dans la mesure où $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y(x)) = -1 = \lim_{x \rightarrow 0} y'(x)$.

Exercice 4.

i) L'équation différentielle $y' = 5(y^4)^{1/5}$ est à variables séparées. Par intégration on obtient

$$\frac{dy}{5(y^4)^{1/5}} = dx \quad \Leftrightarrow \quad y^{1/5} = x - C, \quad C \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad y = (x - C)^5, \quad C \in \mathbb{R}.$$

De plus, on a la solution triviale $y = 0$ qu'on avait perdue en divisant par $(y^4)^{1/5}$.

Avec ceci, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions de l'équation donnée. Il manque les combinaisons par morceaux des solutions décrites ci-dessus, combinées de telle sorte que le résultat soit une fonction continûment différentiable. Les trois éléments qu'on peut combiner sont donc les parties positive et négative de la fonction $(x - C)^5$ pour des valeurs distinctes de C et la fonction triviale $y = 0$. L'ensemble des solutions est ainsi donnée par

$$y(x) = \begin{cases} (x - C_1)^5 & x < C_1 \\ 0 & C_1 \leq x \leq C_2 \\ (x - C_2)^5 & x > C_2 \end{cases} \quad \text{où } C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad C_1 \leq C_2 \quad (1)$$

$$y(x) = \begin{cases} (x - C)^5 & x < C \\ 0 & x \geq C \end{cases} \quad \text{où } C \in \mathbb{R}$$

$$y(x) = \begin{cases} 0 & x \leq C \\ (x - C)^5 & x > C \end{cases} \quad \text{où } C \in \mathbb{R}$$

$$y(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

Notons que la solution obtenue par intégration, $y(x) = (x - C)^5$, correspond à (1) avec $C_1 = C_2$.

ii) Pour que $y(-3) = (-3 - C)^5 = -1$, il faut que $C = -2$ et pour que $y(2) = (2 - C)^5 = 1$, il faut que $C = 1$. La trajectoire cherchée est donc la solution (1) avec $C_1 = -2$ et $C_2 = 1$. C'est la courbe épaisse sur la Fig. 2 qui montre quelques solutions $y(x)$ ainsi que les points $(-3, -1)$ et $(2, 1)$.

Fig. 2

Exercice 5.

Par la méthode de la séparation des variables on trouve pour tout $C \in \mathbb{R}^*$ l'expression

$$u(t) = \frac{1}{1 - Ce^t},$$

ce qui donne pour $C < 0$ des solutions définies sur $\mathbb{R}$, et pour $C > 0$ des solutions définies respectivement sur $]-\infty, -\ln(C)[$ et sur $]-\ln(C), +\infty[$. Ils manquent les solutions à valeur constante $u(t) = 0$ et $u(t) = 1$ définies sur $\mathbb{R}$, obtenues par inspection (cas de division par zéro dans la méthode de la séparation des variables). En résumé la solution générale devrait donc être

$$\left\{ \begin{array}{l} u(t) = 0, t \in \mathbb{R}, \\ u(t) = 1, t \in \mathbb{R}, \\ \forall C < 0, u(t) = \frac{1}{1 - Ce^t}, t \in \mathbb{R}, \\ \forall C > 0, u(t) = \frac{1}{1 - Ce^t}, t \in]-\infty, -\ln(C)[, \\ \forall C > 0, u(t) = \frac{1}{1 - Ce^t}, t \in]-\ln(C), +\infty[\end{array} \right\}.$$

Comment contrôler que l'on a effectivement trouvé la solution générale? Par choix des domaines de définition toutes les solutions indiquées sont maximales, et toutes les solutions sont distinctes. Il suffit donc de contrôler que l'on a bien trouvé toutes les solutions. Pour contrôler cela on utilise le théorème d'existence et d'unicité. L'équation différentielle est $u' = f(t, u)$ avec $f(t, u) = u(u - 1)$. La fonction f est un polynôme est donc continue sur $\mathbb{R}^2$ (voir la suite du cours), et de même pour la fonction dérivée partielle de f par rapport à u (voir la suite du cours). Par le théorème d'existence et d'unicité il existe donc pour tout point $(t_0, u_0) \in \mathbb{R}^2$ une unique solution $u(t)$ telle que $u(t_0) = u_0$. Il suffit donc de vérifier que la liste qui précède contient bien toutes ces solutions. On trouve donc les réponses suivantes aux questions de l'exercice :

- i) Soit $u(t)$ la solution telle que $u(0) = u_0$. Alors, puisque $f(t, u) = u(u - 1)$ ne dépend pas de t (l'équation est autonome) la fonction translatée, $u_{t_0}(t) := u(t - t_0)$ est aussi une solution de l'équation et $u_{t_0}(t_0) = u(t_0 - t_0) = u(0) = u_0$. En effet, si on contrôle la liste

de nos solutions on voit que ou bien les fonctions sont invariants par translation (c'est le cas pour $u(t) = 0$ et $u(t) = 1$), ou bien la translation correspond à un changement de la valeur de C avec la translation adéquate du domaine si $C > 0$. Il suffit donc de contrôler le cas où $t_0 = 0$. Pour $u_0 = 0$ on a la solution $u(t) = 0$ et pour $u(0) = 1$ on a la solution $u(t) = 1$. Pour les autres cas on a

$$u(0) = \frac{1}{1 - C},$$

et on trouve que $C = 1 - 1/u_0$ et donc que $C < 0$ si $0 < u_0 < 1$ et que $C > 0$ si $u_0 > 1$ ou si $u_0 < 0$. Dans tous les cas on a

$$u(t) = \frac{1}{1 - (1 - 1/u_0)e^t} = \frac{u_0}{(1 - e^t)u_0 + e^t}$$

sur les domaines correspondants.

- ii) La discussion précédente montre que l'ensemble des solutions maximales donné en haut est complète et c'est donc bien la solution générale.

Exercice 6.

- i) On a

$$t'(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x(x-1)}$$

et donc

$$y'(x) = u'(t(x)) \frac{1}{x(x-1)},$$

et on obtient que pour toute solution $u(t)$ de l'exercice précédent

$$x(x-1)y'(x) = u'(t(x)) = u(t(x))(u(t(x)) - 1) = y(x)(y(x) - 1)$$

sur tout intervalle ouvert I tel que $t(I) \subset J$, où J est le domaine de la fonction u en question. Inversement, si y est une solution de l'équation de départ sur un intervalle ouvert J ne contenant ni $x = 0$ ni $x = 1$, on peut inverser la restriction à J de la fonction $t(x)$, et la fonction $u(t) = y(x(t))$ est solution de l'équation de l'exercice précédent sur l'intervalle I correspondant.

- ii) Pour contrôler que la solution générale donnée dans le corrigé de la série A1, Exercice 5, est correcte, c'est-à-dire pour contrôler que l'ensemble contient toutes les solutions de l'équation, il suffit de vérifier que toutes les solutions de la forme $y(x) = u(t(x))$ font partie de cette ensemble.

A partir des solution $u(t) = 0$ et $u(t) = 1$ on trouve les solutions $y(x) = 0$ et $y(x) = 1$. Pour les autres cas on a

$$y(x) = u(t(x)) = \frac{1}{1 - Ce^{t(x)}} = \frac{1}{1 - C \exp(\ln|\frac{x-1}{x}|)} = \frac{|x|}{|x| - C|x-1|}.$$

Pour $x > 1$ on obtient

$$y(x) = \frac{x}{x - C(x-1)} = \frac{x}{(1-C)x + C},$$

pour $0 < x < 1$ on obtient

$$y(x) = \frac{x}{x + C(x-1)} = \frac{x}{(1+C)x - C} = \frac{x}{(1-C')x + C'}$$

avec $C' = -C$, et pour $x < 0$ on trouve

$$y(x) = \frac{-x}{-x + C(x-1)} = \frac{x}{x - C(x-1)} = \frac{x}{(1-C)x + C}$$

Les solutions ainsi obtenues ne sont hélas pas maximales. Pour obtenir les solutions maximales indiquées dans le corrigé de la série A1, Exercice 5, il faut contrôler les limites des fonctions $y(x)$ en $x = 0$ et $x = 1$ (ceci correspond à étudier les limites $t \rightarrow \pm\infty$ des solutions de l'exercice précédent), ce qui permet de "recoller" les solutions non maximales, de sorte à obtenir des solutions maximales sur les intervalles indiqués dans le corrigé de la série A1, Exercice 5.

Une autre manière de procéder est de constater que l'équation de départ est de la forme $y' = f(x, y) = \frac{y(y-1)}{x(x-1)}$ et que la fonction f ainsi que la fonction dérivée partielle de f par rapport à y sont continues sur les demi-plans $x < 0$ et $x > 1$ ainsi que sur la bande verticale telle que $0 < x < 1$, puis on construit pour chaque cas la solution générale avec les vérifications comme dans l'exercice précédent. De nouveau, il faut encore recoller les solutions ainsi obtenues pour obtenir les solutions maximales de l'équation de départ.

On constate donc qu'une solution d'une équation différentielle peut être maximale ou pas en fonction de l'écriture de l'équation !

Exercice 7. (QCM : problème de Cauchy)

La solution $y(x)$ de l'équation différentielle $xy' - y = x$ pour $x \in]0, \infty[$ avec la condition initiale $y(1) = 0$ vérifie

$y(2) = \ln(2)$

$y(2) = -2 \ln(2)$

$y(2) = 2 \ln(2)$

$y(2) = 2 \ln(2) + 2$

Exercice 8. (QCM : séparation des variables)

La solution $y(x)$ de l'équation différentielle $y' - \cos(x)y + \cos(x)y^2 = 0$ pour $x \in \mathbb{R}$ avec la condition initiale $y(0) = \frac{1}{2}$ est :

$y(x) = \frac{1}{1 + e^{\sin(x)}}$

$y(x) = -\frac{1}{2}e^{-\sin(x)}$

$y(x) = \frac{1}{1 + e^{-\sin(x)}}$

$y(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{1}{2}\sin(x)}}$

Exercice 9. (QCM : problème de Cauchy)

La solution $y(x)$ de l'équation différentielle $y'' - 8y' + 41y = 0$ pour $x \in \mathbb{R}$ avec les conditions initiales $y(0) = 7$ et $y'(0) = -2$ est :

$y(x) = e^{5x} \left(7 \cos(4x) - \frac{37}{4} \sin(4x) \right)$

$y(x) = (-37x + 7)e^{5x}$

$y(x) = 37e^{4x} - 30e^{5x}$

$y(x) = e^{4x} (7 \cos(5x) - 6 \sin(5x))$