

# Cours Euler: Corrigé 17

7 janvier 2026

## Exercice 1

- a)  $1000 \cdot 1000 = 10^3 \cdot 10^3 = 10^6 = 1000000$
- b)  $100000 \cdot 1000 = 10^5 \cdot 10^3 = 10^8 = 100000000$
- c)  $10000 \cdot 0,001 = 10^4 \cdot 10^{-3} = 10$
- d)  $1000 \cdot 0,001 = 10^3 \cdot 10^{-3} = 10^0 = 1$
- e)  $0,001 \cdot 0,01 = 10^{-3} \cdot 10^{-2} = 10^{-5} = 0,00001$
- f)  $0,0001 \cdot 100 \cdot 0,01 = 10^{-4} \cdot 10^2 \cdot 10^{-2} = 10^{-4} = 0,0001$
- g)  $0,01^3 = (10^{-2})^3 = 10^{-6} = 0,000001$
- h)  $0,01 : 100 = 10^{-2} : 10^2 = 10^{-4} = 0,0001$
- i)  $100000 : 0,01 = 10^5 : 10^{-2} = 10^7 = 10000000$
- j)  $10 : 10000 = 10 : 10^4 = 10^{-3}$

## Exercice 2

- a) Le nombre de neurones est égal à  $100 \cdot 10^9 = 10^{11}$ .
- b) Le nombre de connexions est le nombre de connexions par neurone multiplié par le nombre de neurones. Ce nombre est alors :

$$10^{11} \cdot 10^4 = 10^{15}$$

- c) Si  $50 \cdot 10^3$  neurones disparaissent par jour, il y en a  $365 \cdot 50 \cdot 10^3 = 18250 \cdot 10^3$  qui disparaissent chaque année. On se demande donc quel est le nombre d'années  $n$  qui vérifie  $n \cdot 18250 \cdot 10^3 = 10^{11}$ . On peut simplifier par  $10^4$  pour trouver l'équation équivalente

$$n \cdot 1825 = 10^7$$

Ainsi le nombre d'années  $n$  vaut  $10^7 : 1825 \approx 5479$ .

Si tu as 12 ans, alors il te reste  $10^{11} - 5 \cdot 10^4 \cdot 365 \cdot 12 = 10^{11} - 2,19 \cdot 10^8 = 1000 \cdot 10^8 - 2,19 \cdot 10^8 = 9997,81 \cdot 10^8 \approx 10^{11}$ . Ton nombre de neurones ne change pratiquement pas !

## Exercice 3

### Notation scientifique.

**Partie A.** Une calculatrice affiche, par exemple :  $1. \ 10^0$  ce qui signifie  $1 \cdot 10^{10}$ . Le plus grand nombre qu'on peut atteindre est, par exemple,  $10^{10}$ . Certaines calculatrices peuvent atteindre  $10^{99}$ .

**Partie B.**

- (a)  $2000 \cdot 0,0014 = 2 \cdot 10^3 \cdot 1,4 \cdot 10^{-3} = 2,8$
- (b)  $0,024 \cdot 0,0011 = 2,4 \cdot 10^{-2} \cdot 1,1 \cdot 10^{-3} = 2,64 \cdot 10^{-5} = 0,0000264$
- (c)  $(0,07)^2 = (7 \cdot 10^{-2})^2 = 49 \cdot 10^{-4} = 4,9 \cdot 10^{-3} = 0,0049$
- (d)  $(-21,2)^2 = 449,44 = 4,4944 \cdot 10^2$
- (e)  $0,0012 : 0,04 = (1,2 \cdot 10^{-3}) : (4 \cdot 10^{-2}) = 0,3 \cdot 10^{-1} = 3 \cdot 10^{-2} = 0,03$
- (f)  $15000 : 0,005 = (1,5 \cdot 10^4) : (5 \cdot 10^{-3}) = 0,3 \cdot 10^7 = 3 \cdot 10^6 = 3000000$
- (g)  $(-250)^2(-0,001)^3 = -6,25 \cdot 10^4 \cdot 10^{-9} = -6,25 \cdot 10^{-5} = -0,0000625$
- (h)  $(0,05)^{-1} : (0,005)^{-2} = (5 \cdot 10^{-2})^{-1} : (5 \cdot 10^{-3})^{-2} = \frac{1}{5} \cdot 10^2 \cdot (5 \cdot 10^{-3})^2 = \frac{1}{5} \cdot 10^2 \cdot 5^2 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-4} = 0,0005$

**Partie C.** En notation scientifique :

1.  $0,000\,000\,01$  secondes  $= 10^{-8}$  secondes

2. Une année lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. La lumière se déplace dans le vide à  $300\,000$  km/s. Calculons la durée d'une année en secondes : une année compte 365 jours, un jour compte 24 heures, une heure compte 3600 secondes. Donc une année compte  $365 \cdot 24 \cdot 3600 = 31\,536\,000$  secondes.

Donc une année lumière en km compte

$$31536000 \cdot 300000 = 3,1536 \cdot 10^7 \cdot 3 \cdot 10^5 = 9,4608 \cdot 10^{12}$$

$$\text{Donc 2 millions d'années lumières} = 2 \cdot 10^6 \cdot 9,4608 \cdot 10^{12} = 1,89216 \cdot 10^{19}.$$

**Exercice 4****NO 195.**

Pour Solange :  $4^2 \cdot 4^4 = (2^2)^2 \cdot (2^2)^4 = 2^4 \cdot 2^8$ . Pour Charly :  $4^2 \cdot 4^4 = 4^6$  car les exposants s'additionnent et pour Jérôme :  $4^2 \cdot 4^4 = 16 \cdot (4^2)^2 = 16 \cdot 16^2 = 16^3$ . Dans tous les cas, on tombe sur la valeur  $4^2 \cdot 4^4$ .

**NO 196.**

Dans la première partie on utilise le fait que  $a^{n+k} + a^n = a^n(a^k + 1)$ , de même pour une soustraction. Dans la deuxième partie c'est la règle vue en cours  $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ . Pour un produit de puissances *du même nombre* les exposants s'additionnent.

Pour la division  $a^n : a^m = a^{n-m}$ , les exposants se soustraient ; et enfin la puissance d'une puissance  $(a^n)^m = a^{nm}$ . Les exposants se multiplient.

**NO 197.**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a) $2^2 \cdot 2^5 = 2^7 = 128$    | h) $5^2 \cdot 2^2 = (2 \cdot 5)^2 = 100$        |
| b) $4^4 \cdot 4^2 = 4^6 = 4096$   | i) $2^7 - 2^3 = 2^3(2^4 - 1) = 8(16 - 1) = 120$ |
| c) $3^3 + 3^3 = 2 \cdot 3^3 = 54$ | j) $10^6 : 10^2 = 10^4$                         |
| d) $10^0 : 10^0 = 1$              | k) $2^{(2^3)} = 2^8 = 256$                      |
| e) $10^6 - 10^2 = 999900$         | l) $2^{(2^3)} = 2^8 = 256$                      |
| f) $7^3 - 6^3 = 127$              | m) $2^2 + 2^5 = 36$                             |
| g) $(5^1)^2 = 5^2 = 25$           | n) $(10^3)^2 = 10^6$                            |

o)  $\frac{10^3}{10^6} = 10^{-3}$

p)  $10^3 \cdot 10^2 = 10^5$

q)  $\frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$

r)  $3^3 \cdot 4^2 = 27 \cdot 16 = 432$

**Exercice 5**

- a) est correcte, les exposants s'additionnent, les deux valent donc  $3^{10}$ . Par contre  
 b) est fausse pour la même raison :  $4 + 2 \neq 2 + 5$ .  
 c) est fausse aussi car  $3 + 5 \neq 3 \cdot 2$ , par contre  
 d) est vraie. Ensuite  
 e) est fausse car  $6^3 \cdot 6^3 = (6^3)^2$ .  
 f) est fausse car les exposants ne se distribuent pas. De fait  $7^3 + 7^4 = 7^3(1 + 7) = 8 \cdot 7^3$   
 g) est vraie. Par contre pour  
 h)  $9^3 : 9 = 9^2$  et  
 i)  $10000^5 = (10^4)^5 = 10^{20}$  et enfin  
 j)  $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \neq 49$ .

**Exercice 6**

Remarque : le point h) ne figure pas pas dans l'énoncé. A partir de ce dernier, les points i) - o) correspondent aux question h) - n) respectivement.

- |  |            |
|--|------------|
| a) $x = 2$   | h) $f = 3$ |
| b) $x = 1$   | i) $b = 6$ |
| c) $x = 0$   | j) $x = 1$ |
| d) $x = -6$  | k) $k = 2$ |
| e) $x = 2$   | l) $x = 1$ |
| f) $a = 4$ et $y = 2$<br>$a = 2$ et $y = 4$<br>$a = 16$ et $y = 1$ | m) $x = 2$ |
| g) $p = 3$   | n) $x = 3$ |
|  | o) $x = 1$ |

**Exercice 7**

## Série 1

1.  $2a^2 \cdot 3a^4 = 6a^6$

2.  $(-3b^2)(-2b^3) = 6b^5$

3.  $4a^2(-2b^2) = -8a^2b^2 = -8(ab)^2$

4.  $3a^3b^2(-5a^5b^4) = -15a^8b^6$

5.  $(2a^2)^3 = 2^3a^6 = 8a^6$

6.  $(-3b^4)^2 = 9b^8$

7.  $(-5a^2b^3)^3 = (-5)^3a^6b^9$

8.  $-(-2a^2b)^2 = -((-2)^2a^4b^2) = -4a^4b^2$

9.  $\left(\frac{1}{2a^2}\right)^3 = \frac{1}{8a^6} = \frac{1}{8}a^{-6}$

10.  $\left(\frac{-3b^3}{4}\right)^2 = \frac{9b^6}{16} = \frac{9}{16}b^6$

11.  $\left(-\frac{a^2}{b^5}\right)^3 = \left(-\frac{a^6}{b^{15}}\right) = -\frac{a^6}{b^{15}}$

$$12. -\left(-\frac{a}{b^4}\right)^2 = -\frac{a^2}{b^8}$$

Série 2.

$$1. (-2a^2a^3)^2 = 4(a^5)^2 = 4a^{10}$$

$$2. (-3a^2b \cdot ab^2)^3 = -3^3(a^3b^3)^3 = -27a^9b^9$$

$$3. (-4a^2b)^2(2ab)^3 = 16a^4b^2 \cdot 8a^3b^3 = 128a^7b^5$$

$$4. (-4a^3b^3)^2 + (2a^2b^2)^3 = 16a^6b^6 + 8a^6b^6 = 24a^6b^6$$

$$5. \left(\frac{2a^3}{3a}\right)^2 = \left(\frac{2a^2}{3}\right)^2 = \frac{4a^4}{9}$$

$$6. \left(-\frac{3}{5}a^3\right)\left(\frac{25}{9}a^2\right) = -\frac{5}{3}a^5$$

$$7. (0,2a^2)(0,1a^3)^2 = (0,2a^2)(0,01a^6) = 0,002a^8$$

$$8. 2a^5 - (-3a^2)^3 = 2a^5 - (-27a^6) = 2a^5 + 27a^6$$

$$9. -\left(\frac{-2a^3b}{3ab^3}\right)^2 = -\left(\frac{-2a^2}{3b^2}\right)^2 = -\frac{4a^4}{9b^4}$$

$$10. 9a\left(\frac{4b}{6a}\right)^3 = 9a\left(\frac{2b}{3a}\right)^3 = 9a\frac{8b^3}{27a^3} = \frac{8b^3}{3a^2}$$

### Exercice 8

Dans cet exercice nous utiliserons la proposition sur les propriétés des fractions. Par exemple nous écrivons 3. pour faire référence à la troisième propriété dans cette proposition.

1. Pour montrer que toute puissance paire d'un nombre réel est positive, nous utiliserons sans preuve le fait suivant : Le carré de n'importe quel nombre réel est positif.

Maintenant, considérons  $x^{2n}$  pour un nombre réel  $x$  et un nombre entier  $n$ . Si  $n = 0$ , alors par la définition de la puissance,  $x^{2n} = x^0 = 1 \geq 0$ . Si  $n \neq 0$ , alors en utilisant la propriété (vi) des puissances entières, on a que

$$x^{2n} = x^{n+n} \stackrel{(vi)}{=} x^n \cdot x^n = (x^n)^2.$$

Ainsi,  $x^{2n}$  est un carré d'un nombre réel et donc positif.

2. Soit  $a$  un nombre entier et  $x$  un nombre réel non nul. Pour montrer que  $\left(\frac{1}{x}\right)^a$  est l'inverse de  $x^a$  il suffit de multiplier l'un par l'autre et prouver que le résultat donne 1, Calculons donc en utilisant la propriété 1, i.e., la puissance d'un produit est le produit des puissances :

$$\left(\frac{1}{x}\right)^a \cdot x^a = \left(\frac{1}{x} \cdot x\right)^a = 1^a = 1$$

puisque  $1/x$  est l'inverse de  $x$  et que la puissance  $a$ -ème de 1 vaut 1.

3. On a  $(x^a)^b = x^{a \cdot b} = x^{b \cdot a} = (x^b)^a$  par la propriété 4. des puissances et la commutativité de la multiplication pour l'égalité centrale.

4. On calcule :

$$\begin{aligned} (x - y)^3 &= (x - y)(x - y)^2 = x(x - y)^2 - y(x - y)^2 && \text{distribution de } \cdot \text{ sur } + \text{ et } - \text{ dans } \mathbb{R} \\ &= x(x^2 - 2xy + y^2) - y(x^2 - 2xy + y^2) && \text{identité remarquable} \\ &= x^3 - 2x^2y + xy^2 - (yx^2 - 2xy^2 + y^3) && \text{par distributivité} \\ &= x^3 - 2x^2y + xy^2 - yx^2 + 2xy^2 - y^3 && \text{l'opposé se distribue sur toute la parenthèse} \\ &= x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 && \text{commutativité de } \cdot \text{ et commutativité de } + \end{aligned}$$

### Exercice 9

#### Partie A.

$$(a) \sqrt{60} = \sqrt{4 \cdot 15} = \sqrt{15}\sqrt{4} = 2\sqrt{15} = \sqrt{4}\sqrt{3 \cdot 5} = \sqrt{12}\sqrt{5}$$

Mais  $3\sqrt{20} = 6\sqrt{5}$  est différent des autres expressions.

(b)  $\sqrt{27} = \sqrt{20+7} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3} = \sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}$

Mais  $3\sqrt{9} = 9$  est différent des autres expressions.

(c)  $\sqrt{441} = \sqrt{49}\sqrt{9} = 7\sqrt{9} = \sqrt{21}\sqrt{3}\sqrt{7} = \sqrt{400} + \sqrt{1} = 20 + 1 = 21$

Toutes les expressions sont égales.

(d)  $\sqrt{\frac{25}{64}} = \frac{1}{8}\sqrt{25} = \frac{5}{8} = \frac{5}{\sqrt{64}}$

Mais  $\frac{2,5}{6,4} = \frac{5}{12,8}$  est différent des autres expressions.

### Partie B.

a)  $\sqrt{175} = \sqrt{5 \cdot 35} = 5\sqrt{7}$

b)  $\sqrt{300} = \sqrt{3 \cdot 10^2} = 10\sqrt{3}$

c)  $\sqrt[3]{1080} = \sqrt[3]{9 \cdot 120} = \sqrt[3]{27 \cdot 40} = 3\sqrt[3]{8 \cdot 5} = 6\sqrt[3]{5}$

d)  $5\sqrt{252} = 5\sqrt{2 \cdot 126} = 5\sqrt{4 \cdot 63} = 10\sqrt{9 \cdot 7} = 30\sqrt{7}$

e)  $\sqrt{18} + \sqrt{32} = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$

f)  $\sqrt{50}\sqrt{2}\sqrt{8} = \sqrt{25 \cdot 2 \cdot 4} = 20\sqrt{2}$

g)  $\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3} = -5$

### Partie C.

(a)  $\sqrt{900} = 30$

(b)  $\sqrt{0,04} = 0,2$

(c)  $\sqrt[3]{1000000} = 100$

(d)  $\sqrt{10^6} = 1000 = 10^3$

(e)  $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$

(f)  $\sqrt{0,25} = 0,5$

(g)  $\sqrt[3]{-1} = -1$

(h)  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{800} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{100} = 40$

(i)  $\sqrt{17^2} = 17$

(j)  $\sqrt{1521} = \sqrt{9 \cdot 169} = 3 \cdot 13 = 39$

(k)  $\sqrt{81} + \sqrt{121} = 9 + 11 = 20$

(l)  $\sqrt{12} : \sqrt{3} = \sqrt{4} = 2$

### Exercice 10

Les nombres  $a$  et  $b$  étant réels, énonce les conditions d'existence des expressions suivantes. Par exemple l'expression  $\sqrt{-a}$  existe si  $a \leq 0$ .

1.  $\sqrt{ab}$  existe si  $a$  et  $b$  sont de même signe (y compris si l'un des deux est nul).

2.  $\sqrt{-ab}$  existe si  $a$  et  $b$  sont de signes différents (ou si l'un des deux est nul).

3.  $\sqrt{-a^3b^3}$  existe si  $a$  et  $b$  sont de signes différents (ou si l'un des deux est nul).

4.  $\sqrt{\frac{a}{b}}$  existe si  $b$  est non nul et si  $a$  et  $b$  sont de même signe.

5.  $\sqrt{\frac{a^3}{b^2}}$  existe si  $a$  est positif et  $b$  est non nul.

6.  $\sqrt{\frac{ab}{b}}$  existe si  $b$  est non nul et si  $a$  est positif.

7.  $\sqrt{\frac{-a^2}{b}}$  existe si  $b < 0$  ou si  $b > 0$  et  $a = 0$ .

8.  $\sqrt{-a^2b}$  existe si  $b$  est négatif ou si l'un des deux nombres  $a$  ou  $b$  est nul.

**Exercice 11 (Optionnel)**

Le nombre  $10^{2017}$  a exactement 2018 chiffres, il commence par 1 et est suivi de 2017 zéros. Lorsqu'on soustrait 1 on obtient un nombre à 2017 chiffres constitué de 9 uniquement. Soustrayons encore 2016 on trouve un nombre qui a toujours 2017 chiffres, seuls les 4 derniers chiffres ont été modifiés et sont maintenant  $9999 - 2016 = 7983$ . Par conséquent la somme des chiffres du nombre cherché vaut

$$2013 \cdot 9 + 7 + 9 + 8 + 3 = 18'144$$

**Exercice 12 (Optionnel)*****GARAM (solutions)***

Fill in the blanks with one digit so that each line and column is a valid equation.  
Two-digit numbers are read on two consecutive squares in the direction of the equation.  
(Two-digit numbers don't start with 0)

$3 \times 2 = 6$	$2 + 3 = 5$
$+$	$\times$
9	8
$\equiv$	$\equiv$
1	1
$2 \times 2 = 4$	$4 - 4 = 0$
$+$	$\times$
5	1
$\equiv$	$\equiv$
Easy (Tutorial)	
$2 + 7 = 9$	$3 + 4 = 7$
$+$	$\times$
9	8
$\equiv$	$\equiv$
1	2
$1 + 7 = 8$	$4 \times 4 = 8$

$6 - 2 = 4$	$5 + 1 = 6$
$\times$	$\times$
9	8
$\equiv$	$\equiv$
5	4
$4 - 2 = 2$	$5 + 3 = 8$
$+$	$+$
4	2
$\equiv$	$\equiv$
Medium	
$3 + 6 = 9$	$7 - 5 = 2$
$\times$	$\times$
7	5
$\equiv$	$\equiv$
2	3
$1 + 4 = 5$	$0 + 8 = 8$

$8 \times 1 = 8$	$3 \times 3 = 9$
$+$	$+$
3	8
$\equiv$	$\equiv$
1	1
$1 - 1 = 0$	$1 \times 1 = 1$
$+$	$+$
2	3
$\equiv$	$\equiv$
Advanced	
$2 \times 3 = 6$	$6 - 4 = 2$
$+$	$\times$
9	8
$\equiv$	$\equiv$
1	4
$1 + 1 = 2$	$8 + 0 = 8$

$6 + 3 = 9$	$2 \times 1 = 2$
$\times$	$\times$
4	8
$\equiv$	$\equiv$
2	1
$4 + 3 = 7$	$6 + 2 = 8$
$+$	$\times$
3	1
$\equiv$	$\equiv$
Hard	
$3 + 6 = 9$	$3 \times 2 = 6$
$\times$	$\times$
7	9
$\equiv$	$\equiv$
2	6
$1 + 6 = 7$	$7 - 1 = 6$