

Cours Euler: Série 18

14 janvier 2026

Dans les exercices suivants, l'auteur utilise le mot « radicaux » pour racines.

Exercice 1

9. Simplifie les expressions suivantes en te servant des propriétés des radicaux
($a \in \mathbb{R}^+$, $b \in \mathbb{R}_0^+$, $c \in \mathbb{R}^+$):

$$\begin{array}{ll} 1) \sqrt{a^2bc^3} & 3) \sqrt{a^3b^3c^4} \\ 2) \sqrt{\frac{a^5}{b^2}c^3} & 4) \sqrt{a^2 \frac{a^3b^4}{b^3}c^2} \end{array}$$

10. Simplifie les expressions suivantes après avoir précisé les conditions d'existence et sans changer celles-ci:

a. 1) $\sqrt{a^4b^2}$ 3) $\sqrt{\frac{a^3}{b^4}}$
2) $\sqrt{a^7b^3}$ ★ 4) $\sqrt{a^3b^4}$

Exercice 2

A l'aide des propriétés des racines carrées, rends rationnel le dénominateur des expressions suivantes.
Indication. une identité remarquable sera parfois utile.


$$\begin{array}{llll} 1) \frac{1}{\sqrt{2}} & 3) \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{2}} & 5) \frac{5 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} & 7) \frac{19\sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}} \\ 2) \frac{5}{\sqrt{3}} & 4) \sqrt{\frac{5}{2}} & 6) \frac{1}{1 + \sqrt{2}} & \end{array}$$

Exercice 3

Complète à l'aide des signes \leq , $<$, $=$, $>$ ou \geq les énoncés suivants :

- 1) $\sqrt{16+9} \dots 4+3$
- 2) $\sqrt{25+5} \dots 5+\sqrt{5}$
- 3) $\sqrt{8+3} \dots \sqrt{8}+\sqrt{3}$
- 4) $\sqrt{a^2+b^2} \dots a+b$ ($a \in \mathbb{R}_0^+, b \in \mathbb{R}_0^+$)

Pour ce faire, tu peux t'aider d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont a et b pour mesure et t'inspirer de l'inégalité triangulaire.



- 5) $\sqrt{a^2+0} \dots a+0$ ou $\sqrt{0+b^2} \dots 0+b$ ($a \in \mathbb{R}_0^+, b \in \mathbb{R}_0^+$)

D'où si $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$, alors on a $\sqrt{a^2+b^2} \dots a+b$.

- 6) Pour a et b des nombres réels non nuls, quelles sont les relations d'égalité ($=$), de non égalité (\neq), et d'ordre ($<$, \leq) que l'on peut éventuellement établir entre

$$\sqrt{a^2+b^2}, \quad a+b, \quad \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}, \quad |a| + |b|.$$

Exercice 4

- 13.** Calcule, sans l'aide de ta calculatrice, en ne laissant ni exposant ni racine dans ta réponse :

- 1) $\sqrt{81}$
- 2) $\sqrt[3]{27}$
- 3) $\sqrt[3]{-125}$
- 4) $-\sqrt[3]{8}$
- 5) $\sqrt[4]{16^2}$
- 6) $\sqrt[3]{8^{-1}}$
- 7) $\sqrt[6]{4^{-9}}$
- 8) $\sqrt[3]{-2^6}$

- 14.** Calcule à l'aide de ta machine, la valeur approchée de la racine cubique à 10^{-2} près par défaut des réels suivants :

- 1) -65
- 2) π
- 3) $\sqrt{5}$
- 4) $\sqrt{456}$
- 5) $1 - \sqrt{3}$
- 6) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$



- 15.** En utilisant les propriétés des racines nièmes, effectue et simplifie :

- 1) $\sqrt[3]{9} \sqrt[3]{37}$
- 2) $\sqrt[3]{16} \sqrt[3]{32}$
- 3) $\sqrt[3]{a^4} \sqrt[3]{a^5}$
- 4) $\frac{\sqrt[3]{2^4}}{\sqrt[3]{2}}$

16. ★

Rends rationnels les dénominateurs des fractions suivantes :

- 1) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
- 2) $\frac{1}{\sqrt[3]{25}}$
- 3) $\frac{1}{\sqrt[5]{4}}$
- 4) $\frac{1}{\sqrt[3]{27}}$
- 5) $\frac{\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{4}}$
- 6) $\frac{\sqrt[3]{72}}{\sqrt[3]{9}}$

- 17.** Calcule le carré et le cube de :

- 1) $\sqrt{2}$
- 2) $\sqrt[3]{\frac{5}{4}}$
- 3) $\sqrt[3]{3} + 1$
- 4) $\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}$

- 18.** Écris plus simplement et donne les conditions d'existence :

- 1) $\sqrt{\sqrt{a^2}}$
- 2) $\sqrt[3]{\sqrt{b^2}}$
- 3) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{b^2}}$
- 4) $\sqrt{\sqrt[3]{-a^2}}$

- 19.** Effectue et simplifie :

- 1) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt{2}$
- 2) $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt[3]{3}}$

Exercice 5 (Optionnel)

La calculatrice est autorisée pour cet exercice où les réponses sont demandées au millième, si elles ont un sens. Attention à l'ordre des opérations !

Série 1. 1) $\sqrt[3]{7}$ 2) $\sqrt[5]{2^3}$ 3) $\sqrt[7]{-3^2}$ 4) $\sqrt[7]{(-3)^2}$ 5) $\sqrt[6]{1/3}$ 6) $\sqrt[7]{\frac{1}{\sqrt{2}}}$

Série 2. 1) $\left(2 + \frac{1}{7}\right)^{1/2}$ 2) $3^{1/4} - \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^{1/3}$ 3) $\sqrt{(2+3)^{\frac{1}{3}}}$ 4) $\sqrt{2^{\frac{1}{3}} + 3^{\frac{1}{3}}}$

Série 3. Si $a = \frac{2}{7}$, $b = \sqrt{3}$ et $c = -\frac{2}{3}$, utilise les mémoires de ta calculette pour trouver :

1) $a + b\sqrt[3]{c}$ 2) $(a+b)\sqrt[3]{c}$ 3) $(a+b)^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{3}}$ 4) $\left[(a+b)c^{\frac{1}{3}}\right]^{\frac{1}{2}}$
 5) $\sqrt{a+b^{\frac{1}{2}}}$ 6) $(\sqrt{a+b})^4$ 7) $(a+b+c)^{\frac{1}{2}}$ 8) $\left(\frac{a}{b+c}\right)^{-\frac{2}{3}}$

Exercice 6

Partie A. Calcule les expressions suivantes en utilisant les propriétés des puissances rationnelles (sans passer par des racines).

(a) $3^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2}}$ (c) $6^{\frac{1}{4}} \cdot 6^{\frac{1}{2}} \cdot 6^{-\frac{3}{4}}$ (e) $\frac{27^{\frac{4}{3}}}{27^{\frac{2}{3}}}$
 (b) $7^{\frac{5}{2}} \cdot 7^{-\frac{3}{2}}$ (d) $\frac{2^{\frac{7}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}}$ (f) $(-27)^{\frac{2}{3}} \cdot 3^{-1}$

Partie B. Ici $a > 0$, $m \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$. Ecris les expressions suivantes à l'aide d'exposants :

(a) \sqrt{a} , $\sqrt[7]{a}$, $\sqrt{a^7}$, $\sqrt{a^2}$ (d) $\sqrt{\frac{a^3}{a^6}}$, $\sqrt[8]{\frac{a^{24}}{a^{12}}}$, $(\sqrt[7]{a^6})^2$
 (b) $\sqrt[3]{a^3}$, $\sqrt[3]{a^9}$, $\sqrt[4]{a^{12}}$, $\sqrt[4]{a^{18}}$ (e) $\sqrt[m]{a^n}$, $\sqrt[3]{a^{2n}}$, $\sqrt[3m]{a^{6n}}$,
 (c) $\sqrt{a^0}$, $\sqrt[4]{a^2}$, $\sqrt[3]{\frac{1}{a}}$, $\sqrt[16]{a^8}$ (f) $\frac{a^n}{\sqrt[m]{a^0}}$, $\sqrt[2m]{\frac{a^{3n}}{a^{2n}}}$, $\sqrt[8m]{a^{2n}}$

Partie C. Ici $a > 0$, $m \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$. Ecris les expressions suivantes sous forme de racine et de puissance :

(a) $a^{\frac{1}{2}}$, $a^{\frac{3}{4}}$, $a^{\frac{7}{1}}$ (c) $a^{\frac{1}{m}}$, $a^{\frac{n}{m}}$, $a^{-\frac{1}{m}}$
 (b) $a^{\frac{4}{6}}$, $a^{\frac{16}{12}}$, $a^{-\frac{1}{3}}$ (d) $a^{-\frac{n}{m}}$, $a^{\frac{2n}{6m}}$

Exercice 7

Un peu de théorie. On demande une démonstration avec tous les détails et les justifications !

- 1) Démontre que $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ si n est pair.
- 2) Démontre les propriétés des racines (2) (racine d'un quotient) et (5) (produit de deux racines d'un même nombre) de la Proposition 2.4.
- 3) Démontre la propriété des puissances rationnelles (2) : $\left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r}$.

Exercice 8

Pour 20. et 21., utilise les *propriétés des puissances rationnelles* pour simplifier les expressions.

20. Écris sous la forme d'une puissance de a ($a \in \mathbb{R}_0^+$) les expressions suivantes ; donne ensuite une réponse sans exposant négatif, ni fractionnaire :

$$\begin{array}{ll} 1) a^{\frac{1}{2}}a^{\frac{3}{4}} & 5) a^{-\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{4}} \\ 2) (a^{-\frac{1}{2}})^2 & 6) \left(\frac{2}{a^{\frac{-1}{2}}}\right)^3 \\ 3) a^{-\frac{1}{2}}a^2 & 7) a^{1,25}a^{1,50} \\ 4) \left(\frac{a^{\frac{2}{3}}}{a^{-\frac{1}{3}}}\right)^{\frac{1}{2}} & 8) (a^{-\frac{1}{4}})^{-2} \left(a^{\frac{3}{4}}\right)^{-1} \end{array}$$

21. ★

Utilise les exposants fractionnaires pour simplifier les expressions suivantes ; donne ensuite une réponse sans exposant négatif, ni fractionnaire ($a \in \mathbb{R}_0^+$) :

$$\begin{array}{ll} 1) \sqrt[3]{a^2}\sqrt{a} & 5) \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{a^2}} \\ 2) \sqrt[4]{a^2}\sqrt[3]{a} & 6) \left(\frac{\sqrt[3]{a^{-1}}}{a\sqrt{a^{-2}}}\right)^3 \\ 3) \sqrt[3]{a}\sqrt{a} & 7) \frac{27a^{-2}\sqrt{a^4}}{64\sqrt{a}\sqrt{a}} \\ 4) \frac{\sqrt[3]{a}\sqrt{a^3}}{\sqrt[6]{a^5}} & \end{array}$$

Exercice 9

Vrai ou faux ? Justifie tes réponses.

$$\begin{array}{lll} 1) (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} = a + b \text{ si } a, b \in \mathbb{R} & 3) \sqrt[n]{x^{3n}} = x^3 \text{ si } x \in \mathbb{R}_+ & 5) \sqrt[6]{(-2)^2} = \sqrt[3]{-2} \\ 2) (a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}) = a - b & \text{si } a, b \in \mathbb{R}_+ & 4) \sqrt[4]{2^2} = 2^{\frac{1}{2}} \\ & & 6) \sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2} \end{array}$$

Exercice 10

Monômes. Dans cet exercice on travaille dans l'algèbre de polynômes $\mathbb{R}[x, y, z, m, a, b, u]$.

1) Trouve le coefficient, la partie littérale et le degré des monômes suivants :

$$-5x \quad 2z^3 \quad \frac{9}{2}y^8 \quad -0,02 \quad m^4 \quad 3x^2yz \quad \frac{ab}{2}$$

2) Dans la liste suivante quels sont les monômes semblables ?

$$5x \quad 5y \quad \frac{9}{2}y^3 \quad xy \quad \frac{x}{2} \quad (xy)^2 \quad \sqrt{2}y^3$$

3) Pour réduire une expression littérale comme $6b \cdot 3b$, il faut comprendre que la juxtaposition représente un produit, puis utiliser les propriétés de commutativité de la multiplication :

$$6b \cdot 3b = 6 \cdot b \cdot 3 \cdot b = 6 \cdot 3 \cdot b \cdot b = 18 \cdot b^2 = 18b^2$$

Fais de même dans les cas suivants :

$$\begin{array}{lll} \text{a)} 4a \cdot 3 & \text{c)} z \cdot u & \text{e)} -10x \cdot (-10x) \cdot (-10) \\ \text{b)} 12x \cdot 2x & \text{d)} 4z \cdot 1,5 \cdot 2z & \text{f)} y \cdot y \cdot 4z \end{array}$$

Exercice 11

Carrés magiques. On dit qu'un carré est *magique* si la somme des termes de chaque ligne, de chaque colonne et des deux diagonales donne la même réponse.

59.

Ces carrés sont-ils magiques pour l'addition ?

x	$3x - 2$	$2x + 2$
$3x + 2$	$2x$	$x - 2$
$2x - 2$	$x + 2$	$3x$

x	12	$2x$
$2x + 4$	$x + 3$	5
8	$2x - 3$	$x + 7$

Les carrés suivants sont-ils magiques pour la multiplication ?

x^2	x^3	x^4
x^5	x^3	x
x^2	x^3	x^4

2	$2x^2$	$x + 1$
$0,5x^2$	$2x$	4
$4x$	1	x^2

L'exercice suivant a un rapport étroit avec le sujet étudié, mais il est difficile !

Exercice 12 (Optionnel)

Tiré du programme PROMYS. Pour réfléchir à un problèmes proposé aux gymnasien de plus de 15 ans pour pouvoir participer à une école d'été de mathématiques !

Si le polynôme $(x + 1)^{1000}$ est développé, combien de *coefficients* sont impairs ? Combien ne sont pas divisibles par 3 ? par 5 ? Peut-on généraliser ?