

## Série 14

---

**Exercice 1.** Calcule le rayon du cercle circonscrit à un triangle dont les côtés sont de longueur  $a = 24.9$ ,  $b = 33.2$  et  $c = 41.5$ .

\* **Exercice 2. Résolution de triangles I.** Détermine le triangle  $\Delta ABC$  (les angles, les longueurs des côtés et l'aire) dans les cas suivants.

- 1)  $\alpha = 43^\circ$ ,  $a = 10$  et  $\beta = 102^\circ$ ;    2)  $a = 12$ ,  $b = 20$  et  $c = 9$ ;    3)  $a = 13$ ,  $b = 20$  et  $\alpha = 32^\circ$ ;  
4)  $a = 5$ ,  $c = 19$  et  $\alpha = 40^\circ$ ;    5)  $b = 20$ ,  $c = 12$  et  $\alpha = 57^\circ$ .

**Exercice 3. Résolution de triangles II.** Sans utiliser la machine, détermine le triangle  $\Delta ABC$  (les angles, les longueurs des côtés et l'aire) si l'on sait que  $a = 1 + \sqrt{3}$ ,  $b = \sqrt{2}$  et  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ .

**Exercice 4. La formule de Héron.** Héron d'Alexandrie a vécu au 1er siècle après J.-C. et on lui attribue la formule que nous allons démontrer ici et qui permet de calculer l'aire d'un triangle sans en connaître ni les angles, ni les hauteurs! Soit donc un triangle  $\Delta ABC$  et  $\sigma$  son aire.


- Le théorème de l'aire nous dit que  $\sigma = \frac{1}{2}ab \sin(\gamma)$ . Utilise la relation  $\sin^2(\gamma) + \cos^2(\gamma) = 1$  pour obtenir une expression de  $\sigma$  en fonction du cosinus de  $\gamma$ .
- Utilise ensuite le Théorème du cosinus pour obtenir une expression de  $\sigma$  en fonction uniquement des longueurs des côtés  $a$ ,  $b$  et  $c$ .
- Simplifie l'expression que tu as trouvée en introduisant le demi-périmètre  $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ . Montre que  $\sigma = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ . C'est la formule de Héron.
- Utilise la formule de Héron pour calculer l'aire d'un triangle équilatéral de 10 cm de côté. Calcule cette aire d'une autre manière et compare tes résultats.
- Utilise la formule de Héron pour calculer l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent  $a = 12$ ,  $b = 20$  et  $c = 9$ .

**Exercice 5.** Vrai ou faux? Justifie tes réponses.

- Si  $\cos(2x) = \sin(2x)$ , alors  $x = \frac{\pi}{8}$ .
- On considère un triangle dont les côtés sont de longueur 10, 10 et 20. Alors la formule de Héron donne que l'aire de ce triangle est nulle.
- $\sin(3x) = \sin(x) \cdot (4 \cos^2(x) - 1)$ .

\* **Exercice 6.** Un bateau de pêche utilise un sonar pour détecter un banc de poissons situé à 3 km à l'est du bateau et suivant le cap N51°W (c'est-à-dire en direction du nord-ouest en faisant un angle de 51 degrés avec le nord) à la vitesse de 12 km/h. Si la vitesse du bateau est de 30 km/h, détermine son cap pour qu'il intercepte le banc et le temps en minutes nécessaire pour atteindre le banc.

**Exercice 7.** Sur la diagonale  $[AC]$  d'un rectangle  $ABCD$ , on considère un point  $E$  tel que l'angle  $\widehat{BEC} = 57^\circ$ . Sachant que  $\overline{AB} = 36$  et  $\overline{AE} = 24$ , calcule la longueur  $\overline{AD}$ .



**Exercice 8.** Détermine le pgdc et le ppmc des nombres entiers suivants avec la méthode d'Euclide :

- a) 3045 et 3451 ;
- b) 23387 et 1285 ;
- c) 241 et 56 ;
- d) 10165 et 3745 ;
- e) 1313 et 481.

**Exercice 9.** Simplifie les fractions  $\frac{7375}{472}$ ,  $\frac{241}{56}$  et  $\frac{4998}{2737}$ .

**Exercice 10.** Vrai ou faux ? Si  $\text{pgdc}(a, b) = 1$  et  $\text{pgdc}(b, c) = 1$ , alors aussi  $\text{pgdc}(a, c) = 1$ . Justifie ta réponse.

**Exercice 11.** Vrai ou faux ? Si 2 divise  $\text{pgdc}(a, b)$  et  $\text{pgdc}(b, c)$ , alors 2 divise aussi  $\text{pgdc}(a, c)$ . Justifie ta réponse.

**Exercice 12.** Soit  $p$  un nombre premier et  $a$  un nombre entier naturel quelconque. Donne toutes les possibilités des valeurs de  $\text{pgdc}(a, p)$  et illustre-les par un exemple.

**Exercice 13.** Détermine le pgdc et le ppmc des polynômes suivants :

- a)  $3x(x + 2)$ ,  $2x(x - 1)$  et  $x^2 + x - 2$  ;
- b)  $x^2 - x$ ,  $x^3 - 3x^2 + 2x$  et  $x^3 - 4x^2 + 3x$  ;
- c)  $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ ,  $x^3 + 1$  et  $x^3 - x^2 + x$ .

**Exercice 14.** Détermine le pgdc des polynômes  $f(x)$  et  $g(x)$ , puis simplifie la fraction  $\frac{f(x)}{g(x)}$  :

- a)  $f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$  et  $g(x) = x^2 + 3x + 2$  ;
- b)  $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$  et  $g(x) = 2x^2 + 3x + 1$  ;
- c)  $f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1$  et  $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$  ;
- d)  $f(x) = x^5 + 5x^4 + 8x^3 + 8x^2 - x - 21$  et  $g(x) = x^4 + 5x^3 + 8x^2 + x - 15$  ;
- e)  $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 8x - 4$  et  $g(x) = x^2 - 5x + 6$  ;
- f)  $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + x + 1$  et  $g(x) = x^2 - x + 1$ .

**Exercice 15.** Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie tes réponses !

- a) Si le degré des polynômes  $f(x)$  et  $g(x)$  est le même, alors leur pgdc vaut 1.
- b) Si le pgdc de deux polynômes  $f(x)$  et  $g(x)$  à coefficients réels est  $x - a$  pour un certain  $a \in \mathbb{R}$ , alors les graphes des fonctions  $f(x)$  et  $g(x)$  se coupent en  $(a, 0)$ .
- c) Si  $d(x) = \text{pgdc}(f(x), g(x))$ , alors  $(d(x))^2 = \text{pgdc}((f(x))^2, (g(x))^2)$ .
- d) Si  $d(x) = \text{pgdc}(f(x), g(x))$ , alors  $d(x) + 1 = \text{pgdc}(f(x) + 1, g(x) + 1)$ .

**Exercice 16.** Détermine le pgdc de 37 894 060 279 et 18 272 779 829. (Attention : chacun de ces deux nombres est un produit de deux nombres premiers à six chiffres.)