
Algèbre linéaire avancée II
printemps 2024

Série 1

L'exercice marqué d'un (+) sert d'introduction à la série, tandis que celui marqué d'une (*) est plus difficile. Tous les exercices sauf celui marqué d'une (*) seront corrigés. La correction sera postée sur Moodle 2 semaines après. Les solutions des exercices (*) et (+) seront discutées dans les séances d'exercices du mardi d'après et d'avant respectivement. Un des exercices (*) sera une question ouverte de l'examen final.

Exercice 1. (+) Soit R un anneau et $\alpha \in Z(R)$ un élément du centre de R . Montrer que l'application

$$\begin{aligned}\Phi: R[x] &\rightarrow R \\ f(x) &\mapsto f(\alpha)\end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux surjectif.

Soit $R = \mathbb{Z}^{2 \times 2}$. Trouver $\alpha \in R$ (qui n'appartient donc pas à $Z(R)$) et deux polynômes $g, h \in R[x]$ tel que

$$g(\alpha) \cdot h(\alpha) \neq (g \cdot h)(\alpha).$$

Exercice 2. Soit R un anneau et $S \subseteq R$. Montrer que S est un anneau si les deux conditions suivantes sont vérifiées:

- a) $1 \in S$
- b) Pour $s, t \in S$ alors $s \cdot t \in S$ et $s - t \in S$.

Exercice 3. Pour cet exercice on travaille sur le corps fini \mathbb{Z}_5 .

- i) Trouver le polynôme $f(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$ de degré au plus 4 tel que $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 4$, $f(3) = 0$, $f(4) = 4$. Établir un système d'équations linéaires correspondant.
- ii) Soient les polynômes $f(x) = 3x^4 + 2x^2 + x + 1$ et $g(x) = 2x^2 + 3x + 2$ sur le corps \mathbb{Z}_5 . Trouver deux polynômes q et r sur \mathbb{Z}_5 tels que :
 - $f = qg + r$ et
 - $\deg(r) < \deg(g)$.

Exercice 4. Soit K un corps. Montrer que le déterminant de $A = V_{r_0, \dots, r_n} \in K^{(n+1) \times (n+1)}$ est

$$\det(V_{r_0, \dots, r_n}) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (r_j - r_i).$$

Exercice 5. Soit K un corps et $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$ des éléments distincts ($n \geq 1$). On définit

$$c_k(x) = \frac{\prod_{i \neq k} (x - a_i)}{\prod_{i \neq k} (a_k - a_i)}$$

et soit $f(x) \in K[x]$ un polynôme tel que $f(x) \equiv 0$ ou $\deg(f(x)) \leq n$. Montrer que

$$f(x) = f(a_0)c_0(x) + f(a_1)c_1(x) + \dots + f(a_n)c_n(x).$$

Exercice 6. Soit $f(x) \in \mathbb{R}[x] \setminus \{0\}$, $\deg(f) \geq 2$.

- i) Si $\deg(f)$ est impair, alors $f(x)$ n'est pas irréductible.
- ii) Si $f(x)$ est irréductible, alors $\deg(f) = 2$.
- iii) Montrer comment ii) implique que chaque polynôme $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg(f) \geq 1$ possède une racine complexe.

Pour le point ii), utiliser le théorème fondamental de l'algèbre¹.

Exercice 7. (*) Soit R un anneau.

- i) Montrer que l'élément 1 est unique.
- ii) Montrer qu'un élément inversible $r \in R^*$ n'est pas un diviseur de zéro.
- iii) Montrer que deux polynômes

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \quad \text{et} \quad q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots \in R[x]$$

sont égaux si et seulement si $a_i = b_i$ pour tous i .

- iv) Soit $R^{n \times n}$ l'anneau des matrices $n \times n$ sur R . Montrer que le centre de $R^{n \times n}$ est $Z(R^{n \times n}) = \{aI_n : a \in Z(R)\}$.

¹Chaque polynôme $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg(f) \geq 1$ possède au moins une racine complexe.