
Analyse I – Série 13

Echauffement. (Formules d'intégration)

- a) Retrouver la formule du changement de variable à partir de la dérivée dérivée d'une composition de fonctions.
- b) Retrouver la formule d'intégration par parties à partir de la dérivée d'un produit de fonctions.

Sol.:

a) La formule pour la dérivée de la fonction composée $g \circ f$ est

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x).$$

En prenant l'intégrale des deux côtés on obtient

$$\int (g \circ f)'(x) dx = \int g'(f(x))f'(x) dx.$$

Comme $g \circ f$ est une primitive de $(g \circ f)'$, on a

$$(g \circ f)(x) + C = \int g'(f(x))f'(x) dx.$$

Puisque la notation de l'intégrale indéfinie vue au cours désigne l'ensemble de toutes les primitives d'une fonction, la constante C peut être absorbée dans la notation de l'intégrale indéfinie à droite, d'où la formule voulue

$$g(f(x)) = \int g'(f(x))f'(x) dx.$$

b) La dérivée du produit des fonctions f et g s'écrit

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

En prenant l'intégrale des deux côtés on obtient

$$\int (f(x)g(x))' dx = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx.$$

Le côté gauche vaut $f(x)g(x) + C$ si bien qu'on trouve la formule d'intégration par parties en absorbant de nouveau la constante dans une des deux autres intégrales indéfinies :

$$\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx.$$

Exercice 1. (Intégration par parties)

Calculer les intégrales suivantes :

$$\text{a) } \int x^2 \cos(x) dx \qquad \text{b) } (*) \int e^{ax} \cos(bx) dx \quad (a \neq 0)$$

Indication : la question b) est plus difficile. En appelant $I_{a,b}$ l'intégrale en question, on cherchera à trouver une équation satisfaite par $I_{a,b}$ en intégrant deux fois par parties (ce qui fera réapparaître $I_{a,b}$).

Sol.:

a) Par intégration par parties d'abord avec $f'(x) = \cos(x) [\Rightarrow f(x) = \sin(x)]$, $g(x) = x^2 [\Rightarrow g'(x) = 2x]$ et puis avec $f'(x) = \sin(x) [\Rightarrow f(x) = -\cos(x)]$, $g(x) = x [\Rightarrow g'(x) = 1]$, il vient

$$\begin{aligned} \int x^2 \cos(x) dx &= \sin(x) x^2 - 2 \int \sin(x) x dx = \sin(x) x^2 - 2 \left(-\cos(x) x + \int \cos(x) dx \right) \\ &= (x^2 - 2) \sin(x) + 2x \cos(x) + C \end{aligned}$$

b) Posons $I_{a,b} = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ et intégrons deux fois par parties avec $f'(x) = e^{ax} [\Rightarrow f(x) = \frac{1}{a} e^{ax}]$ ainsi que $g(x) = \cos(bx) [\Rightarrow g'(x) = -b \sin(bx)]$:

$$I_{a,b} = \frac{1}{a} e^{ax} \cos(bx) + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin(bx) dx$$

Cette dernière intégrale doit aussi être intégrée par parties avec $f(x) = e^{ax}$ et $g(x) = \sin(bx) [\Rightarrow g'(x) = b \cos(bx)]$

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin(bx) - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos(bx) dx$$

On remarque alors que l'intégrale à droite est $I_{a,b}$. Ainsi on peut combiner les deux équations précédentes et isoler $I_{a,b}$. On obtient

$$\begin{aligned} I_{a,b} &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos(bx) + \frac{b}{a} \left(\frac{1}{a} e^{ax} \sin(bx) - \frac{b}{a} I_{a,b} \right) \\ &\Leftrightarrow \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right) I_{a,b} = \frac{e^{ax}}{a} \left(\cos(bx) + \frac{b}{a} \sin(bx) \right) \end{aligned}$$

et donc

$$I_{a,b} = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \left(a \cos(bx) + b \sin(bx) \right) + C, \quad \text{où } c \in \mathbb{R} \text{ est une constante.}$$

Exercice 2. (Intégrales récurrentes)

Trouver une formule de récurrence pour les intégrales suivantes ($n \in \mathbb{N}$) :

$$\text{a) } I_n(x) = \int x^n \sin(2x) dx \qquad \text{b) } I_n(x) = \int \text{Log}(x)^n dx$$

Sol.:

1. On a $I_0 = -\frac{1}{2} \cos(2x) + C$, et

$$I_1 = -\frac{1}{2} x \cos(2x) + \frac{1}{4} \sin(2x) + C \quad (\text{par parties avec } f'(x) = \sin(2x) \text{ et } g(x) = x)$$

et si $n \geq 2$ (encore deux fois par parties),

$$\begin{aligned} I_n &= \int x^n \sin(2x) dx \stackrel{(1)}{=} -\frac{1}{2}x^n \cos(2x) + \frac{1}{2}n \int x^{n-1} \cos(2x) dx \\ &\stackrel{(2)}{=} -\frac{1}{2}x^n \cos(2x) + \frac{n}{2} \left[\frac{1}{2}x^{n-1} \sin(2x) - \frac{1}{2}(n-1) \int x^{n-2} \sin(2x) dx \right] \\ &= \frac{x^{n-1}}{4} (n \sin(2x) - 2x \cos(2x)) - \frac{n(n-1)}{4} I_{n-2}, \end{aligned}$$

où (1): $f'(x) = \sin(2x)$ et $g(x) = x^n$ et (2): $f'(x) = \cos(2x)$ et $g(x) = x^{n-1}$.

2. Posons $I_n = \int \text{Log}(x)^n dx$. Alors $I_0 = x + C$. Pour $n \geq 1$ on intègre par parties avec $f'(x) = 1$ et $g(x) = \text{Log}(x)^n$:

$$I_n = \int 1 \cdot \text{Log}(x)^n dx = x \text{Log}(x)^n - n \int x \text{Log}(x)^{n-1} \frac{1}{x} dx = x \text{Log}(x)^n - n I_{n-1}.$$

Exercice 3. (Changement de variable)

Trouver des primitives pour les fonctions f données ci-dessous en utilisant le changement de variable $x = \varphi(u)$ indiqué :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & x = \sin(u) \\ \text{b) } f(x) = \frac{1}{1+x^2}, & x = \text{tg}(u) \\ \text{c) } f(x) = \frac{1}{e^x+1}, & x = \text{Log}(t) \\ \text{d) } f(x) = x\sqrt{x-1}, & x = t^2+1 \end{array}$$

Sol.: La formule pour le changement de variable $x = \varphi(u)$ est $\int f(x) dx = \int f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$.

a) Pour $x = \varphi(u) = \sin(u)$ on a $f(\varphi(u)) = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(u)}} = \frac{1}{\sqrt{\cos^2(u)}} = \frac{1}{\cos(u)}$ et $\varphi'(u) = \cos(u)$. Ainsi

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\cos(u)}{\cos(u)} du = \int du = u + C = \text{Arcsin}(x) + C,$$

où on a utilisé que $u = \varphi^{-1}(x) = \text{Arcsin}(x)$.

b) Pour $x = \varphi(u) = \text{tg}(u)$ on a $f(\varphi(u)) = \frac{1}{1+\text{tg}^2(u)} = \frac{\cos^2(u)}{\cos^2(u)+\sin^2(u)} = \cos^2(u)$ et $\varphi'(u) = \frac{1}{\cos^2(u)}$. Ainsi

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \int \frac{\cos^2(u)}{\cos^2(u)} du = \int du = u + C = \text{Arctg}(x) + C,$$

où on a utilisé que $u = \varphi^{-1}(x) = \text{Arctg}(x)$.

c) Pour $x = \varphi(t) = \text{Log}(t)$ on a $f(\varphi(t)) = \frac{1}{e^{\text{Log}(t)}+1} = \frac{1}{1+t}$ et $\varphi'(t) = \frac{1}{t}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{e^x+1} dx &= \int \frac{1}{t(1+t)} dt = \int \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} dt = \text{Log}(t) - \text{Log}(t+1) + C \\ &= \text{Log}\left(1 - \frac{1}{t+1}\right) + C = \text{Log}\left(1 - \frac{1}{e^x+1}\right) + C = -\text{Log}\left(1 + e^{-x}\right) + C. \end{aligned}$$

où on a utilisé que $t = \varphi^{-1}(x) = e^x$.

d) Pour $x = \varphi(t) = t^2 + 1$ on a $f(\varphi(t)) = (t^2 + 1)\sqrt{t^2 + 1 - 1} = t(t^2 + 1)$ et $\varphi'(t) = 2t$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x-1} dx &= \int 2t^2(t^2 + 1) dt = \int 2t^4 + 2t^2 dt = \frac{2t^5}{5} + \frac{2t^3}{3} + C \\ &= \frac{2(x-1)^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{2(x-1)^{\frac{3}{2}}}{3} + C \end{aligned}$$

où on a utilisé que $t = \varphi^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$.

Exercice 4. (Changement de variable)

Calculer les intégrales définies suivantes :

$$\text{a) } \int_0^{\pi/2} \sin(x)^5 dx \qquad \text{b) } \int_2^3 \frac{\sqrt{x+1}}{x} dx \qquad \text{c) } \int_{\pi^2/16}^{\pi^2/9} \cos(\sqrt{x}) dx$$

Indication : pour a), on peut utiliser $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$ puis le changement de variable $t = \varphi(x) = \cos(x)$. Pour b) on peut poser $x = \varphi(u) = u^2 - 1$. Pour c) on peut poser $x = \varphi(u) = u^2$.

Sol.:

a) En utilisant que $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1$, on observe que

$$\sin(x)^5 = (1 - \cos(x)^2)^2 \sin(x) = -f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

avec $t = \varphi(x) = \cos(x)$ et $f(t) = (1 - t^2)^2$.

Comme les bornes de x sont $\alpha = 0$ et $\beta = \frac{\pi}{2}$, les bornes de t sont $a = \varphi(\alpha) = 1$ et $b = \varphi(\beta) = 0$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos(x)^2)^2 \sin(x) dx &= - \int_1^0 (1 - t^2)^2 dt = \int_0^1 (1 - 2t^2 + t^4) dt \\ &= \left[t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{8}{15}. \end{aligned}$$

b) On pose $x = \varphi(u) = u^2 - 1$, $\varphi'(u) = 2u$. Comme x varie entre $a = 2 = \varphi(\sqrt{3})$ et $b = 3 = \varphi(2)$, les bornes de u sont $\alpha = \sqrt{3}$ et $\beta = 2$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{\sqrt{x+1}}{x} dx &= 2 \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{u^2}{u^2 - 1} du = 2 \int_{\sqrt{3}}^2 \left(1 + \frac{1}{u^2 - 1} \right) du \\ &= 2 \int_{\sqrt{3}}^2 du + \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{u+1 - (u-1)}{(u+1)(u-1)} du \\ &= 2 \int_{\sqrt{3}}^2 du + \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{1}{u-1} du - \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{1}{u+1} du \\ &= \left[2u + \text{Log}\left(\left|\frac{u-1}{u+1}\right|\right) \right]_{\sqrt{3}}^2 = 4 - 2\sqrt{3} + \text{Log}\left(\frac{\sqrt{3}+1}{3(\sqrt{3}-1)}\right). \end{aligned}$$

c) Le changement de variable à poser est $x = \varphi(u) = u^2$, $\varphi'(u) = 2u$. Comme x varie entre $a = \frac{\pi^2}{16} = \varphi\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $b = \frac{\pi^2}{9} = \varphi\left(\frac{\pi}{3}\right)$, les bornes de u sont $\alpha = \frac{\pi}{4}$ et $\beta = \frac{\pi}{3}$.

$$\begin{aligned} \int_{\pi^2/16}^{\pi^2/9} \cos(\sqrt{x}) dx &= 2 \int_{\pi/4}^{\pi/3} u \cos(u) du \stackrel{(*)}{=} 2 \left[u \sin(u) \right]_{\pi/4}^{\pi/3} - 2 \int_{\pi/4}^{\pi/3} \sin(u) du \\ &= 2 \left[u \sin(u) + \cos(u) \right]_{\pi/4}^{\pi/3} = 1 - \sqrt{2} - \frac{\pi\sqrt{2}}{4} + \frac{\pi\sqrt{3}}{3}, \end{aligned}$$

où on a intégré (*) par parties avec $f'(u) = \cos(u)$, $g(u) = u$.

Exercice 5. (Intégrale définie)

Calculer l'intégrale

$$\int_0^{\pi^{1/33}} \sin(\sin(x^{33})) \cos(x^{33}) x^{32} dx .$$

Sol.: La formule du changement de variable pour $x = \varphi(u)$ avec $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ est

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du \quad \text{avec} \quad \varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b .$$

On pose alors le changement de variable $x = \varphi(u) = u^{1/33}$. Ainsi on a $a = 0 = \varphi(\alpha)$ et $b = \pi^{1/33} = \varphi(\beta)$ si bien que les nouvelles bornes de l'intégrale par rapport à u sont $\alpha = 0$ et $\beta = \pi$.

Comme

$$\varphi'(u) = \frac{1}{33} u^{1/33-1} ,$$

on a

$$\varphi(u)^{32} \varphi'(u) = u^{32/33} \cdot \frac{1}{33} u^{1/33-1} = \frac{1}{33}$$

et l'expression à intégrer en u est

$$\sin(\sin(\varphi(u)^{33})) \cos(\varphi(u)^{33}) \varphi(u)^{32} \varphi'(u) = \frac{1}{33} \sin(\sin(u)) \cos(u) .$$

L'intégrale est alors

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi^{1/33}} \sin(\sin(x^{33})) \cos(x^{33}) x^{32} dx &= \frac{1}{33} \int_0^\pi \sin(\sin(u)) \cos(u) du \\ &= \frac{1}{33} \left[-\cos(\sin(u)) \right]_0^\pi \quad \text{car} \quad (\sin(u))' = \cos(u) \\ &= \frac{1}{33} \left(-\cos(\sin(\pi)) + \cos(\sin(0)) \right) \\ &= \frac{1}{33} (-\cos(0) + \cos(0)) = 0 . \end{aligned}$$

Exercice 6. (Intégration de développements limités)Calculer le développement limité d'ordre 7 autour de 0 de la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\text{a) } f(x) = \int_0^x \text{Log}(1+t^2) dt \qquad \text{b) } f(x) = \int_0^{x^2} e^{\sin(t)} dt$$

Sol.:

a) Par le théorème fondamental du calcul intégral on a $f'(x) = \text{Log}(1+x^2)$. On va donc trouver le développement limité d'ordre 6 de f' autour de 0 et ensuite intégrer comme vu durant le cours. Puisque

$$\text{Log}(1+x^2) = x^2 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 + x^6\varepsilon(x) ,$$

on obtient en intégrant

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{10}x^5 + \frac{1}{21}x^7 + x^7\varepsilon(x) .$$

Pour l'intégration du reste $x^7\varepsilon(x)$, il faut utiliser le théorème de la moyenne (cf. démonstration vue au cours).

b) On commence par écrire f comme composée de deux fonctions :

$$f(x) = \int_0^{x^2} e^{\sin(t)} dt = (h \circ g)(x) \quad \text{avec} \quad g(x) = x^2 \quad \text{et} \quad h(u) = \int_0^u e^{\sin(t)} dt .$$

Pour calculer le développement limité d'ordre 7 (ou 8) de f , il suffit donc de calculer le développement limité d'ordre 4 de h ou, par le théorème fondamental du calcul intégral, le développement limité d'ordre 3 de $e^{\sin(t)}$. On a

$$\sin(t) = t - \frac{1}{6}t^3 + t^3\varepsilon(t) .$$

Il faut substituer ce développement limité dans celui de la fonction e^s autour de $\sin(0) = 0$, c'est-à-dire dans

$$e^s = 1 + s + \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{6}s^3 + s^3\varepsilon(s) .$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} e^{\sin(t)} &= 1 + \left(t - \frac{1}{6}t^3 + t^3\varepsilon(t) \right) + \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{6}t^3 + t^3\varepsilon(t) \right)^2 + \frac{1}{6} \left(t - \frac{1}{6}t^3 + t^3\varepsilon(t) \right)^3 + t^3\varepsilon(t) \\ &= 1 + \left(t - \frac{1}{6}t^3 \right) + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + t^3\varepsilon(t) \\ &= 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + t^3\varepsilon(t) . \end{aligned}$$

En intégrant on trouve le développement limité de la fonction h autour de $u = 0$,

$$h(u) = \int_0^u \left(1 + t + \frac{1}{2}t^2 + t^3\varepsilon(t) \right) dt = u + \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{6}u^3 + u^4\varepsilon(u) ,$$

et donc

$$f(x) = h(x^2) = x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{6}x^6 + x^8\varepsilon(x) .$$

Exercice 7. (Fonctions rationnelles)

Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

$$\text{a) } \int \frac{x-2}{x(x+1)^2} dx \quad \text{b) } \int \frac{x^3}{(1+x^2)^2} dx \quad \text{c) } \int \frac{x^2-2}{x^3-x^2} dx \quad \text{d) } \int \frac{4x}{x^4-1} dx$$

Sol.: Pour intégrer des fractions polynomiales du type i), ii) et iii), la méthode des éléments simples est particulièrement adaptée.

a) La décomposition en éléments simples est

$$\frac{x-2}{x(x+1)^2} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma}{(x+1)^2}, \quad \text{avec} \quad \alpha = -2, \quad \beta = 2, \quad \gamma = 3.$$

Ainsi

$$\int \frac{x-2}{x(x+1)^2} dx = \int \left(-\frac{2}{x} + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} \right) dx = -2 \operatorname{Log} |x| + 2 \operatorname{Log} |x+1| - \frac{3}{x+1} + C.$$

b) La décomposition en éléments simples est

$$\frac{x^3}{(1+x^2)^2} = \frac{\alpha x + \beta}{1+x^2} + \frac{\gamma x + \delta}{(1+x^2)^2}, \quad \text{avec} \quad \alpha = 1, \quad \beta = 0, \quad \gamma = -1, \quad \delta = 0,$$

d'où

$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^2} dx = \int \left(\frac{x}{1+x^2} + \frac{-x}{(1+x^2)^2} \right) dx = \frac{1}{2} \operatorname{Log}(1+x^2) + \frac{1}{2(1+x^2)} + C.$$

c) La décomposition en éléments simples est

$$\frac{x^2-2}{x^3-x^2} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x^2} + \frac{\gamma}{x-1}, \quad \text{avec} \quad \alpha = 2, \quad \beta = 2, \quad \gamma = -1.$$

On obtient donc

$$\int \frac{x^2-2}{x^3-x^2} dx = \int \left(\frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = 2 \operatorname{Log}(|x|) - \operatorname{Log}(|x-1|) - \frac{2}{x} + C.$$

d) La décomposition en éléments simples est


$$\frac{4x}{x^4-1} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma x + \delta}{x^2+1}, \quad \text{avec} \quad \alpha = 1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = -2, \quad \delta = 0,$$

d'où

$$\int \frac{4x}{x^4-1} dx = \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} - \frac{2x}{x^2+1} \right) dx = \operatorname{Log} \left(\frac{|x^2-1|}{x^2+1} \right) + C.$$

Exercice 8. (Fonctions hyperboliques)

Soient $P = (x, y)$ et $Q = (x, -y)$ des points de l'hyperbole $x^2 - y^2 = 1$ ($x \geq 1$) et t l'aire de la région comprise entre l'hyperbole et les rayons OP et OQ (aire grise sur la figure ci-contre). Montrer que $x = \operatorname{ch}(t)$ et $y = \operatorname{sh}(t)$.



Sol.: Soit la fonction $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $y = f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$. L'aire cherchée est alors

$$t = xy - 2 \int_1^x f(w) dw = xy - 2 \int_1^x \sqrt{w^2 - 1} dw .$$

On pose $w = \varphi(u) = \text{ch}(u)$. Ainsi $\varphi'(u) = \text{sh}(u)$ et u varie entre 0 et $a := \text{Arccosh}(x)$ car $\varphi(0) = 1$ et $\varphi(a) = x$. L'intégrale devient

$$2 \int_1^x \sqrt{w^2 - 1} dw = 2 \int_0^a \sqrt{\text{ch}(u)^2 - 1} \cdot \text{sh}(u) du = 2 \int_0^a \text{sh}(u)^2 du =: I .$$

Pour calculer I , on intègre par parties avec $f'(u) = g(u) = \text{sh}(u)$:

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^a \text{sh}(u)^2 du = 2 \left[\text{ch}(u) \text{sh}(u) \right]_0^a - 2 \int_0^a \underbrace{\text{ch}(u)^2}_{=1+\text{sh}(u)^2} du \\ &= 2 \text{ch}(a) \text{sh}(a) - 2 \int_0^a 1 du - I . \end{aligned}$$

Il suit que

$$I = \text{ch}(a) \text{sh}(a) - a = x \underbrace{\sqrt{x^2 - 1}}_{=y} - \text{ch}(x) = xy - \text{Arccosh}(x) .$$

Ainsi $t = xy - I = \text{Arccosh}(x)$ et donc $x = \text{ch}(t)$, $y = \sqrt{x^2 - 1} = \text{sh}(t)$.

Exercice 9. (V/F : Intégration)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert non-vide et borné et soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

a) f admet une primitive sur I .

V F

Dans la suite on restreint le domaine de f à l'intervalle $[a, b] \subset I$ où $a, b \in I$ tels que $a < b$.

b) Si $\int_a^b f(x) dx = 0$, alors f admet un zéro en $[a, b]$.

c) Si $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, alors $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

d) Si $f(x) < 0$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx < 0$.

Soit encore F une primitive de f sur $[a, b]$.

e) Si $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $F(x) \leq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

f) Pour tout $x \in [a, b]$, on a $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Sol.:

a) **VRAI.**

Soit $a \in I$ (donc a n'est pas une borne de I). On va montrer que pour tout $x \in I$, la fonction F définie par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est une primitive de f en vérifiant que $F'(x) = f(x)$ à l'aide de la définition de la dérivée. En effet, on a

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Noter que la dernière égalité reste vraie pour $h < 0$ car $\int_x^{x+h} f(t) dt = -\int_{x+h}^x f(t) dt$. Par le théorème de la moyenne (f est continue sur l'intervalle $[x, x+h] \subset I$ si $h > 0$ ou $[x+h, x] \subset I$ si $h < 0$), il suit que $\int_x^{x+h} f(t) dt = f(u_h)h$ pour un $u_h \in]x, x+h[$ si $h > 0$ ou $u_h \in]x+h, x[$ si $h < 0$. Ainsi on a

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} h f(u_h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(u_h) = f(x)$$

parce que $u_h \rightarrow x$ quand $h \rightarrow 0$ et que f est continue sur I .

b) **VRAI.**

Par le théorème de la moyenne, il existe $u \in]a, b[$ tel que $0 = \int_a^b f(x) dx = f(u)(b-a)$. Comme $b > a$, on doit avoir $f(u) = 0$.

c) **FAUX.**

Prendre par exemple $f(x) = x$ sur l'intervalle $[-1, 2]$. Alors $\int_{-1}^2 f(x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = \frac{3}{2} \geq 0$ mais $f(-1) = -1 < 0$.

d) **VRAI.**

Par le théorème de la moyenne, il existe $u \in]a, b[$ tel que $\int_a^b f(x) dx = f(u)(b-a)$. Comme on a $f(u) < 0$ et que $b > a$, le résultat suit.

e) **FAUX.**

Prendre par exemple $f(x) = x$ sur l'intervalle $[-2, -1]$. Ainsi $f(x) \leq 0$ sur $[-2, -1]$ mais $F(x) = \frac{1}{2}x^2 > 0$ pour tout $x \in [-2, -1]$.

f) **FAUX.**

Considérer par exemple la fonction constante $f(x) = 1$ sur l'intervalle $[0, 1]$. Alors $F(x) = x + 1$ est une primitive de f mais

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x 1 dt = x - 0 = x \neq x + 1 = F(x).$$