Les exercices indiqués par une étoile $\star$ sont optionnels.

Exercice 1.

Dans chacun des cas suivants, déterminer si l'idéal proposé est premier ou maximal.

(a) $(0) \subset \mathbb{Z}$.	(f) $(t^2 - 2) \subset \mathbb{Z}[t]$.
(b) $(t) \subset \mathbb{Z}[t]$.	(g) $(t^2 - 2) \subset \mathbb{R}[t]$.
(c) $(t) \subset \mathbb{R}[t]$.	(h) $(t + 5, 10) \subset \mathbb{Z}[t]$.
(d) $(101) \subset \mathbb{Z}[t]$.	(i) $(t + 5, 11) \subset \mathbb{Z}[t]$.
(e) $(42) \subset \mathbb{Z}[t]$.	(j) $(t^2 + 1, 2) \subset \mathbb{Z}[t]$.

Indication : Pour prouver qu'un idéal bilatère $I \subset A$ est premier, il suffit de montrer que le quotient A/I est intègre.

Exercice 2. 1. Discuter les systèmes suivants : $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 7 \pmod{12} \end{cases}$ et $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 8 \pmod{12} \end{cases}$

2. Montrer que $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 3. 1. Soit $f: A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux surjectif tel que $\ker f = (a_1, \dots, a_m)$ pour certains $a_1, \dots, a_m \in A$. Soit aussi $I = (b_1, \dots, b_n) \subseteq B$ un idéal à gauche. Si $c_1, \dots, c_n \in A$ sont tels que $f(c_i) = b_i$ pour chaque i , montrez que $f^{-1}(I) = (a_1, \dots, a_m, c_1, \dots, c_n)$.

2. Soit k un corps, $a, b \in k$ et considérons les homomorphismes d'anneaux k -linéaires

$$\text{ev}_b: k[x, y] \rightarrow k[x], \quad x \mapsto x, \quad y \mapsto b \quad \text{et} \quad \text{ev}_a: k[x, y] \rightarrow k, \quad x \mapsto a$$

et

$$\xi := \text{ev}_a \circ \text{ev}_b: k[x, y] \rightarrow k.$$

Montrez que $\ker \xi = (x - a, y - b)$ et que $\ker \xi$ est un idéal maximal de $k[x, y]$.

On peut en fait montrer que si k est algébriquement clos, alors tous les idéaux maximaux de $k[x, y]$ sont de cette forme. C'est une conséquence du Nullstellensatz d'Hilbert.

Exercice 4.

Dans cet exercice, nous étudions les anneaux $\mathbb{Z}[i]/(p)$ pour p un nombre premier. Nous écrivons $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1. Montrez que $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2 + 1)$.

Indication : Combinez l'exemple 2.4.19 et le quotient en deux temps.

2. Pour $p = 5$, montrez que $\mathbb{Z}[i]/(5) \cong \mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$.

Indication : Le théorème des restes chinois peut être utile.

3. ($\star$) Plus généralement montrez que $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

*Indication: Montrez que l'hypothèse est équivalente à l'existence de deux racines carrées distinctes de -1 dans $\mathbb{F}_p$. Pour une direction, on utilisera que $\mathbb{F}_p^\times$ est un groupe cyclique.**

*Voici une preuve de ce fait. Si ce groupe n'était pas cyclique, par la classification des groupes abéliens de type fini, il existerait $n < p - 1$ tel que $x^n = 1$ pour tout $x \in \mathbb{F}_p^\times$. Mais alors $t^n - 1$ aurait $p - 1$ racines dans $\mathbb{F}_p$ ce qui est absurde.

Exercice 5.

Soient A et B deux anneaux commutatifs. Quels sont les idéaux de $A \times B$? Quels sont les idéaux premiers de $A \times B$?

Exercice 6.

Soit A un anneau commutatif.

1. Montrez que si $\mathfrak{m}$ est maximal et est composé uniquement d'éléments nilpotents, alors c'est l'unique idéal maximal de A . La réciproque est-elle vraie ?
2. Montrez que $A \setminus A^\times$ est un idéal si et seulement si A a un unique idéal maximal.

Exercice 7 (★).

Soit R un anneau commutatif. Déterminer $(R[t])^\times$.

On pourra se ramener au cas intègre en quotientant par des idéaux premiers de R .