

**Exercice 1.** Notons  $h$  la hauteur du cône tronqué. En prolongeant le segment portant  $g$  et celui portant  $h$ , on obtient le cône non tronqué ayant  $H$  pour hauteur et  $G$  pour génératrice. Supposons  $R \neq r$ , par le théorème de Thalès, on calcule  $G$  :  $\frac{R}{R-r} = \frac{G}{g}$  et donc  $G = \frac{gR}{R-r}$ .

**Calcul long.** Par le cours, le cône non tronqué a une aire de la surface latérale égale à  $\pi R \frac{gR}{R-r}$ . Le petit cône qu'il faut rajouter au cône tronqué de départ pour obtenir le cône non tronqué a une aire latérale de  $\pi r(G-g) = \pi r \left( \frac{gR}{R-r} - g \right) = \pi r \frac{gR - gR + gr}{R-r} = \pi r \frac{gr}{R-r}$ . Ainsi l'aire latérale du cône tronqué est la différence des deux aires que l'on vient de calculer :

$$\pi R \frac{gR}{R-r} - \pi r \frac{gr}{R-r} = \pi g \frac{R^2 - r^2}{R-r} = \pi g \frac{(R+r)(R-r)}{R-r} = \pi g(R+r).$$


Si  $R = r$ , la surface latérale est un rectangle de côtés  $2\pi r = 2\pi R = \pi(r + R)$  et  $g$  et donc l'aire vaut  $\pi(r + R)g$ .

**Calcul court.** La différence des surfaces latérales des cônes se calcule plus facilement comme suit.

$$\pi GR - \pi(G-g)r = \pi G(R-r) + \pi gr = \pi \frac{gR}{R-r}(R-r) + \pi gr = \pi gR + \pi gr = \pi g(R+r).$$

**Exercice 2.** Soit  $A'$  la projection orthogonale de  $B$  sur la droite  $AA_1$  (voir la figure ci-dessous). Les triangles  $\Delta OMM_1$  et  $\Delta ABA'$  sont semblables puisqu'il s'agit de triangles qui ont leurs côtés perpendiculaires deux à deux. Ainsi le rapport des longueurs des hypothénuses est égal au rapport des longueurs de deux cathétés correspondants :  $\frac{\overline{OM}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{MM_1}}{\overline{A'B}}$ . Comme  $\overline{A'B} = \overline{A_1B_1}$  et  $\overline{MM_1}$  est le rayon moyen de ce cône de révolution tronqué (par conséquent égal à  $\frac{r+R}{2}$ ), avec le résultat de l'exercice précédent, l'aire latérale vaut

$$\pi(r+R)g = \pi(r+R)\overline{AB} = \pi(r+R)\frac{\overline{OM}}{\overline{MM_1}}\overline{A_1B_1} = 2\pi \cdot \overline{OM} \cdot \overline{A_1B_1}.$$



**Exercice 3.** L'aire de la sphère vaut  $4\pi r^2$ , celle du cylindre (vide)  $2r \cdot 2\pi r = 4\pi r^2$  et celle des 4 disques vaut  $4\pi r^2$ . Ces 3 figures ont la même aire!

**Exercice 4.** Pour un angle d'un radian, le fuseau sphérique a une aire de  $\frac{4\pi r^2}{2\pi} = 2r^2$  et donc pour  $\alpha$  radians :  $\alpha^2 r^2$ .

**Exercice 5.** Un cube de longueur  $a$  a un volume égal à  $a^3$ , tandis qu'un cube d'arrête  $\lambda a$  a un volume égal à  $\lambda^3 a^3$ . Si  $a$  est le côté d'un polyèdre quelconque, alors le volume de ce polyèdre est fonction de  $a^3$ . Par exemple,  $\text{vol(cube)} = a^3$ ,  $\text{vol(tétraèdre)} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ ,  $\text{vol(octaèdre)} = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$ . Ainsi, lorsque l'on cherche le volume d'un polyèdre semblable de côté  $\lambda a$ , il suffit de multiplier le résultat par  $\lambda^3$  comme dans le cas du cube.


**Exercice 6.** Les faces sont des triangles équilatéraux de côté  $a$ . Par Pythagore, la hauteur d'un de ces triangles vaut  $\sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ . Considérons que le tétraèdre est posé sur une de ces faces. Notons  $O'$  la projection

orthogonale du sommet du tétraèdre sur le sol. Comme la face posée sur le sol est un triangle équilatéral, la distance d'un sommet sur le sol à  $O'$  vaut les  $\frac{2}{3}$  de la hauteur d'une face, c'est-à-dire  $\frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ . Considérons un triangle rectangle dont une cathète est la hauteur du tétraèdre,  $h$ , l'hypoténuse est de longueur  $a$  et la dernière cathète est de longueur  $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ . Par Pythagore,  $h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{3}}a$ . L'aire de la base du tétraèdre vaut  $a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$  et donc le volume du prisme vaut, par la formule du volume d'une pyramide,  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}}a \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ .

### Exercice 7.

- a) Calculons la hauteur d'une face triangulaire de la pyramide par Pythagore :  $\sqrt{215^2 - 115^2} = \sqrt{33000} \cong 181.7$ m. Ainsi, en projetant le sommet de la pyramide sur le sol on obtient un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure  $\sqrt{33000}$ , une cathète 115 et la deuxième cathète est la hauteur de la pyramide. Alors par Pythagore la hauteur vaut  $\sqrt{33000 - 115^2} = \sqrt{19775} \cong 140.6$  m.
- b) Par trigonométrie, cet angle vaut  $\arctan\left(\frac{140.6}{115}\right) \cong 50.7^\circ$ .
- c) Cette aire vaut  $4 \cdot 230 \cdot 181.7 \cdot \frac{1}{2} \cong 83563$  m<sup>2</sup>.
- d) Par la formule pour une pyramide, ce volume vaut  $230^2 \cdot h \cdot \frac{1}{3} \cong 2479663$  m<sup>3</sup>.

**Exercice 8.** On obtient les projections suivantes (la projection sur  $Oyz$  est bien un triangle équilatéral) :



Un plan vertical perpendiculaire à l'arête sommitale  $ST$  et passant par  $S$  intersecte le tas de sable selon un triangle équilatéral dont les côtés sont de longueur 2 mètres (voir la projection sur  $Oyz$  ci-dessus). Par Pythagore, la hauteur d'un tel triangle est

$$h = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \text{ m,}$$

qui est donc aussi la hauteur du tas de sable. Deux plans verticaux perpendiculaires à  $ST$  et passant par  $S$  et  $T$  partagent le tas en deux pyramides isométriques  $SC'B'BC$  et  $TA'D'DA$  (le plan par  $S$  intersecte  $AB$  en  $B'$  et  $CD$  en  $C'$ ; le plan par  $T$  intersecte  $AB$  en  $A'$  et  $CD$  en  $D'$ ) de hauteur  $h$  et de base rectangulaire, et un prisme droit à base triangulaire  $C'B'S$  et de hauteur  $\overline{ST}$ .

**Pyramide.** Aire base :  $\sigma(C'B'BC) = 2 \cdot 1 = 2$  m<sup>2</sup>. Hauteur :  $h = \sqrt{3}$  m.

$$\text{Volume} = \frac{1}{3} \cdot \sigma(C'B'BC) \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ m}^3.$$

**Prisme.** Aire base :  $\sigma(C'B'S) = \frac{1}{2} \cdot \overline{C'B'} \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}$  m<sup>2</sup>. Hauteur :  $\overline{ST} = 5 - 2 = 3$  m.  
Volume =  $\sigma(C'B'S) \cdot \overline{ST} = \sqrt{3} \cdot 3 = 3\sqrt{3}$  m<sup>3</sup>.

**Tas de sable.** Volume =  $2 \cdot (\text{Vol. Pyramide}) + (\text{Vol. Prisme}) = 2 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} + 3\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}+9\sqrt{3}}{3} = \frac{13\sqrt{3}}{3}$  m<sup>3</sup>.

Si  $H$  est la projection orthogonale de  $S$  sur le plan  $Oxy$ , on observe que le triangle  $BHS$  est rectangle en  $H$ ; de plus,  $\overline{SH} = \sqrt{3}$  mètres et  $\overline{HB} = \sqrt{2}$  mètres par Pythagore. Si  $\alpha = \widehat{SBH}$ , on a

$$\tan(\alpha) = \frac{\overline{SH}}{\overline{HB}} \quad \text{et donc} \quad \alpha = \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) \cong 50.7^\circ.$$

En calculant  $\overline{SB} = \sqrt{\overline{HB}^2 + \overline{SH}^2} = \sqrt{5}$ , on obtient aussi les expressions équivalentes :

$$\alpha = \sin^{-1} \left( \sqrt{\frac{3}{5}} \right) = \cos^{-1} \left( \sqrt{\frac{2}{5}} \right).$$

**Exercice 9.** Le volume considéré est alors celui d'une pyramide de base hexagonale et de hauteur  $h$ . Par Pythagore,  $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ . Dans une série précédente, nous avons calculé l'aire d'un hexagone inscrit dans un cercle de rayon  $r : \frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$  et donc ici l'aire de l'hexagone vaut  $\frac{27\sqrt{3}}{2} \cong 23.4 \text{ m}^2$ . Cette aire est la surface au sol dont dispose les Indiens. Le volume du tipi est celui d'une pyramide :  $\frac{1}{3} \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 4 = 18\sqrt{3} \cong 31.2 \text{ m}^3$

**Exercice 10.**

**Solution 1.** Dans cette première solution, on considère que la glace ne dépasse pas du cône. Le volume total du cône de glace est de  $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = 30\pi \text{ cm}^3$ . On cherche donc à couper le grand cône parallèlement à sa base de sorte à obtenir un cône (de base de rayon  $r$  et de hauteur  $h$ ) de volume la moitié, soit  $\frac{1}{5}\pi \text{ cm}^3$ —l'autre moitié formera un cône tronqué de même volume. On doit donc avoir  $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 15\pi$ , soit :

$$r^2 \cdot h = 45.$$

En coupe, le grand cône forme un triangle isocèle de demi-base 3 cm et de hauteur 10 cm, alors que le petit cône forme un triangle semblable de demi-base  $r$  et de hauteur  $h$ . Par similitude,  $\frac{10}{h} = \frac{3}{r}$  et conséquemment  $r = \frac{3 \cdot h}{10}$ . L'égalité précédente devient

$$\frac{3^2 \cdot h^2}{10^2} \cdot h = 45.$$

D'où  $h^3 = 500$ . La hauteur à laquelle on doit couper le cône de glace est de  $h = \sqrt[3]{500} \text{ cm}$  à partir du sommet (c'est-à-dire l'extrémité).

**Solution 2.** Dans cette solution, on considère que la glace remplit le cône comme dans la première solution, mais qu'en plus une demi-boule de glace en dépasse. Dans ce cas, le volume total de glace est de  $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 = 48\pi \text{ cm}^3$ , et le demi-volume de  $24\pi \text{ cm}^3$ . On cherche donc  $h$  tel que  $\frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{3h}{10}\right)^2 \cdot h = 24\pi$ , soit  $h = \sqrt[3]{800} \text{ cm}$ .

**Triche.** Une autre solution beaucoup plus rapide mais n'utilisant pas un plan parallèle à la base, serait de couper le cône avec un plan perpendiculaire à la base et passant par le sommet.

**Exercice 11.** Calculons le volume de la boule creuse. Le volume de la boule de 15 cm de rayon vaut  $\frac{4}{3}\pi 15^3$ , celui du « trou »  $\frac{4}{3}\pi 5^3$ . Ainsi la boule creuse a un volume de  $\frac{4}{3}\pi(15^3 - 5^3)$ . En multipliant par la densité on trouve la masse de la boule creuse :  $\frac{4}{3}\pi(15^3 - 5^3) [\text{cm}^3] \cdot 2.5 [\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}] \cong 34034 \text{ grammes} \cong 34 \text{ kg}$ .