

Corrigé Test 2 - Dérivée

19 novembre 2025

Exercice 1. (*7 points*)

Montrer formellement que la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue en tout point de son ensemble de définition.

$$ED(f) = \mathbb{R}^*.$$

f est continue en a si $\forall \varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$, travaillons dans le voisinage $I = \left] \frac{a}{2}; \frac{3a}{2} \right[$ de a .

On veut pour tout x dans I , $|f(x) - f(a)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{a - x}{ax} \right| < \frac{\delta}{ax}$ $\stackrel{x > \frac{a}{2} > 0}{<} \frac{\delta}{a \cdot \frac{a}{2}} = \frac{2\delta}{a^2} = \varepsilon$.

Ainsi, avec $\delta = \frac{\varepsilon a^2}{2}$, la définition de la continuité est vérifiée.

Pour $a \in \mathbb{R}_-^*$, on travaille dans $I = \left] \frac{3a}{2}; \frac{a}{2} \right[$ et on obtient aussi $\delta = \frac{\varepsilon a^2}{2}$ car si $x \in I$, $|x| > \left| \frac{a}{2} \right|$.

On peut aussi voir que f est impaire : $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$.

Ainsi, si f est continue sur \mathbb{R}_+^* , elle l'est aussi sur \mathbb{R}_-^* .

Exercice 2. (*3 + 4 + 4 + 1 = 12 points*)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \left(\frac{x-1}{3x+2} \right)^\pi$

$$f'(x) = \pi \left(\frac{x-1}{3x+2} \right)^{\pi-1} \frac{1 \cdot (3x+2) - (x-1) \cdot 3}{(3x+2)^2} = \pi \left(\frac{x-1}{3x+2} \right)^{\pi-1} \frac{5}{(3x+2)^2} = \frac{5\pi(x-1)^{\pi-1}}{(3x+2)^{\pi+1}}.$$

b) $g(x) = \frac{(2x-1)^3}{(5x+1)^4}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{3 \cdot (2x-1)^2 \cdot 2 \cdot (5x+1)^4 - (2x-1)^3 \cdot 4 \cdot (5x+1)^3 \cdot 5}{(5x+1)^8} \\ &= \frac{2(2x-1)^2(5x+1)^3[3(5x+1) - 10(2x-1)]}{(5x+1)^8} = \frac{2(2x-1)^2(-5x+13)}{(5x+1)^5}. \end{aligned}$$

c) $h(x) = 3\sqrt{2 \sin x \cos x}$

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(3(2 \sin(x) \cos(x))^{\frac{1}{2}} \right)' = 3 \cdot \frac{1}{2} (2 \sin(x) \cos(x))^{-\frac{1}{2}} \cdot (2 \cos(x)^2 - 2 \sin(x)^2) \\ &= 3 \frac{\cos(x)^2 - \sin(x)^2}{\sqrt{2 \cos(x) \sin(x)}} = \frac{3(\cos(x) + \sin(x))(\cos(x) - \sin(x))}{\sqrt{2 \cos(x) \sin(x)}} \text{ ou encore } \frac{3 \cos(2x)}{\sqrt{\sin(2x)}}. \end{aligned}$$

d) $i(x) = \ln(x - x^2) \quad i'(x) = \frac{1-2x}{x-x^2} = \frac{1-2x}{x(1-x)}.$

Exercice 3. ($3 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12$ points)

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x - \sin(2x)}{x - \sin x};$

En utilisant trois fois la règle de Bernoulli-L'Hospital, on voit que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x - \sin(2x)}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x - 2 \cos(2x)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin x + 4 \sin(2x)}{\sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos x + 8 \cos(2x)}{\cos x} = 6. \end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x}{1 - \cos x};$ Ici, on peut évaluer la fonction $\frac{\sin x}{1 - \cos x}$ au point $x = \pi.$

Ainsi, par continuité, on a $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{\sin \pi}{1 - \cos \pi} = \frac{0}{1 - (-1)} = 0.$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \cdot \ln(x^4);$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \ln(x^4) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \ln(x^4) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty.$$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 3x + 1) \cdot e^x \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x + 1}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 3}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0.$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x^2 - 3)}{x - 2} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x^2 - 3)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x^2 - 3} = 4$

Exercice 4. ($3 + 3 + 8 + 3 + 3 = 20$ points) partiellement repris de Burier juin 2022

On considère la fonction f donnée par

$$f(x) = (x - 3) \cdot e^{\sqrt{x}}$$

a) Déterminer l'ensemble de définition ED_f et le signe de f .

$$ED_f = \mathbb{R}_+, \quad \text{zéro de } f : x - 3 = 0 \iff x = 3$$

Signe :

x	-\infty	0	3	+\infty
$f(x)$		-	0	+

b) Déterminer les éventuelles asymptotes de f .

AV : pas de trou ni de bord ouvert dans l'ED de $f \Rightarrow$ pas d'AV.

AH : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = (+\infty)(+\infty) = +\infty \Rightarrow$ pas d'AH

AO : $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 3}{x} \cdot e^{\sqrt{x}} = 1(+\infty) = +\infty \Rightarrow$ pas d'AO.

c) Montrer que $f'(x) = \frac{(2\sqrt{x} + x - 3) \cdot e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$ et étudier la croissance de f .

$$f'(x) = 1 \cdot e^{\sqrt{x}} + (x - 3) \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x} \cdot e^{\sqrt{x}} + (x - 3) \cdot e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} = \frac{(2\sqrt{x} + x - 3) \cdot e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

$$ED(f') = \mathbb{R}_+^*$$

$$\text{zéro de } f' : 2\sqrt{x} + x - 3 = 0 \stackrel{x=y^2}{\Rightarrow} 2y + y^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow (y+3)(y-1) = 0 \Rightarrow x = \sqrt{y} = 1$$

r	- ∞	0	1	+ ∞
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	MIN(1; -2e)			

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{3}{2\sqrt{x}} \right) \cdot e^{\sqrt{x}} = (2 + 0 - \infty) \cdot (+\infty) = -\infty$.

d) Sachant que $f''(x) = \frac{(x\sqrt{x} + 3x - 3\sqrt{x} + 3) \cdot e^{\sqrt{x}}}{4x\sqrt{x}}$, montrer que f est convexe sur ED_f .

$$ED(f'') = \mathbb{R}_+^*$$

zéro de f'' : comme $e^{\sqrt{x}} > 0$ et $x\sqrt{x} > 0 \forall x \in ED(f'') = \mathbb{R}_+^*$, f'' ne s'annule que si

$$x\sqrt{x} + 3x - 3\sqrt{x} + 3 = 0 \stackrel{x=y^2}{\Rightarrow} g(y) = y^3 + 3y^2 - 3y + 3 = 0.$$

Montrons que g ne s'annule jamais et est toujours positive sur \mathbb{R}_+^* :

$$g'(y) = 3y^2 + 6y - 3 = 3(y^2 + 2y - 1) \text{ s'annule en } y = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}.$$

Seule la solution positive $-1 + \sqrt{2}$ nous concerne.

g' est négative sur $]0; -1 + \sqrt{2}[$ et positive sur $] -1 + \sqrt{2}, +\infty[$.

Ainsi g atteint son minimum sur \mathbb{R}_+^* en $-1 + \sqrt{2}$.

Or, $g(-1 + \sqrt{2}) > -3(-1 + \sqrt{2}) + 3 > 0$, donc g est toujours positive sur \mathbb{R}_+^*


Par suite f'' est aussi positive sur \mathbb{R}_+^* , donc f est convexe.

On peut également montrer que $x\sqrt{x} + 3x - 3\sqrt{x} + 3 > 0$ sur \mathbb{R}_+ en constatant que :

— si $x \in [0; 1]$, $x\sqrt{x} + 3x - 3\sqrt{x} + 3 \geq -3\sqrt{x} + 3 = 3(1 - \sqrt{x}) \geq 0$ et

— si $x \in [1; +\infty[$, $x\sqrt{x} + 3x - 3\sqrt{x} + 3 \geq 3x - 3\sqrt{x} = 3(x - \sqrt{x}) \geq 0$.

e) Représenter le graphe de f dans la grille ci-dessous compte tenu de tout ce qui précède.



Exercice 5. (4 points)

Calculer la dérivée de la fonction $f(x) = \cos x$ en utilisant la définition de la dérivée.

$$\begin{aligned}\cos(a)' &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos(x) - \cos(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-2 \sin\left(\frac{x+a}{2}\right) \sin\left(\frac{x-a}{2}\right)}{x - a} = -\lim_{x \rightarrow a} \sin\left(\frac{x+a}{2}\right) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin\left(\frac{x-a}{2}\right)}{\frac{x-a}{2}} \\ &= -\sin(a) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = -\sin(a) \cdot 1 = -\sin(a)\end{aligned}$$

ou encore

$$\begin{aligned}\cos(x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(\frac{2x+h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} \\ &= -\sin(x) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = -\sin(x) \cdot 1 = -\sin(x).\end{aligned}$$

Exercice 6. (5 points)

Démontrer la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions dérivables.

Soit $a \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned}(f \cdot g)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(a) + f(x) \cdot g(a) - f(a) \cdot g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &= f(a) \cdot g'(a) + f'(a) \cdot g(a).\end{aligned}$$

ou encore

$$\begin{aligned}(f \cdot g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \cdot g)(x+h) - (f \cdot g)(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h) \cdot g(x) + f(x+h) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x).\end{aligned}$$